




Abatacept



Orencia Clickject® 125 mg. Pluma precargada

¿Qué es y para que se utiliza?

Abatacept es un agente biológico indicado en el tratamiento de la artritis reumatoide o artritis idiopática juvenil, en pacientes no respondedores a otros tratamientos para la artritis.

¿Cómo conservar?

Conservar en **NEVERA** (entre 2 y 8°C). No congelar.

¿Cómo se administra?

La pauta recomendada es una dosis de 125 mg semanal.

Se administra vía subcutánea de la siguiente manera:

1. Saque la pluma de la nevera 15 minutos para que se atempere. No retirar la tapa ni agitar.
2. Lávese las manos con agua y jabón.
3. Seleccione la zona de inyección (muslo o abdomen al menos a 5 cm del ombligo), evite zonas con dolor, amoratadas o endurecidas.
4. Desinfecte la piel con algodón y alcohol 70°.
5. Retire el capuchón naranja de la pluma.
6. Pellizque la piel con el dedo pulgar e índice y coloque la pluma firmemente sobre la piel en un ángulo de 90°.
7. Presione la pluma hasta hundir el protector transparente que cubre la aguja y pulse el botón azul, escuchara un "clic" alto. Mantenga la pluma de forma fija sobre la piel unos 15 segundos para administrar la medicación completa, podrá visualizar la administración a través de la ventana de visualización.
8. Retire la pluma de su piel.
9. Tire la pluma a un contenedor rígido sin colocar el capuchón.



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA.
SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL DE LA LINEA
AGSCG ESTE




956969276



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



Horario: Lunes a Viernes de 8.00 – 18.00h



¿Qué hacer si olvida una dosis?

Si olvida administrarse la inyección de Orencia y está dentro del plazo de tres días de la fecha prevista, administrar la dosis omitida inmediatamente y permanezca en la pauta semanal original

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos secundarios más frecuentes son: infección de vías respiratorias altas, reacciones en el punto de inyección (picor, erupción, enrojecimiento), cefalea, dolor muscular, dolor articular, mareo, tos, náuseas, diarrea, erupción cutánea.

Avise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Observaciones:

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Abatacept. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Si presenta una infección activa (como gripe), debe suspender temporalmente el tratamiento e informar a su médico o farmacéutico. Algunas vacunas están contraindicadas durante el tratamiento. Consulte con su médico antes de ser vacunado.

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada, informe a su médico. Del mismo modo, no se recomienda la lactancia materna durante el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Sacarosa.

Este medicamento contiene 0,014 mmol de sodio (0,322 mg) por pluma precargada, esto es, esencialmente "exento de sodio".

Presentación

Pluma precargada Clickject con 1 ml de solución es transparente, de incolora a amarillo pálido con un pH de 6,8 a 7,4.

Advertencias

- **Conservar en nevera (2-8°C). NO CONGELAR.**
Si por accidente la medicación quedara fuera de la nevera o se congelara, no la deseche y consulte al farmacéutico.
- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Las plumas administradas no las deseche en la basura doméstica. Tírelo en un contenedor rígido para objetos punzantes y llévelas a cualquier punto SIGRE.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico