



ABIRATERONA

Abiraterona EFG® 500 mg comprimidos (60 comprimidos)

¿Qué es y para que se utiliza?

Se usa para el tratamiento de la neoplasia de próstata.

¿Cómo conservar?

Conservar en el envase original, para protegerlo de la humedad.

¿Cómo se administra?

La dosis habitual es de 1000 mg (**2 comprimidos** de 500 mg) una vez al día. **TIENE QUE TOMARLOS CON EL ESTÓMAGO VACÍO** (1 hora antes o bien 2 horas después de tomar cualquier alimento). Tome los comprimidos enteros, con un poco de agua.

Conjuntamente deberá tomar un corticoide (dexametasona o prednisona) que será prescrita por su médico y a diferencia de *Abiraterona*, deberá tomar acompañado de alimentos para evitar molestias digestivas.

¿Qué hacer si olvida una dosis?

Tómela, a no ser que falte poco para la siguiente administración. Si falta poco para la siguiente, espere a la siguiente sin duplicarla.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Como en todos los medicamentos, puede aparecer algún efecto secundario, aunque no tiene por qué sufrir estos efectos adversos.

Se han descrito alteraciones cardíacas, hipertensión, retención de líquidos, trastornos musculares, aumento de las enzimas hepáticas, disminución del potasio y otras. Si le preocupara cualquiera de estos efectos u otros, contacte con su médico.

Interacciones con otros medicamentos:

Abiraterona puede interactuar con otros medicamentos aumentando o disminuyendo su efecto, por ello debe siempre informar a su médico/farmacéutico de su terapia habitual. Algunos de los medicamentos con los que puede interactuar son: rifampicina, fenitoína, Hierba de San Juan, metoprolol, propranolol, venlafaxina, risperidona, flecainida, codeína, oxicodona y tramadol.



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA
SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL DE LA LINEA
AGSCG ESTE



956969276



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



Horario:

- PRESENCIAL:
Lunes a Viernes:
8.30 – 18:00h



Además, **Abiraterona** puede aumentar el intervalo QT (del electrocardiograma), por lo que se debe evaluar de forma cuidadosa su uso con medicamentos que también lo hagan como los antiarrítmicos de clase IA (p. ej., QUINIDINA, DISOPIRAMIDA) o de clase III (p. ej., AMIODARONA, SOTALOL, DOFETILIDA, IBUTILIDA), METADONA, MOXIFLOXACINO, antipsicóticos (p. ej. HALOPERIDOL), etc.)

Embarazo y lactancia

Se desconoce si se este medicamento pasa al semen, por lo que, si mantiene relaciones sexuales con una mujer en edad fértil, debe utilizar un preservativo y otro método anticonceptivo eficaz. Si mantiene relaciones sexuales con una mujer embarazada, debe utilizar un preservativo para proteger al feto.

Advertencias generales

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.

Recomendaciones especiales

Manipulación Medicamentos especiales:

- Lávese las manos antes y después de manipular la medicación.
- Extraiga los comprimidos o capsulas del envase en el momento de la administración. No conserve en pastilleros o dispositivos similares fuera de su envase.
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua sin masticar, triturar ni chupar.
- En caso que requiera triturar o fraccionar, hagalo dentro de una bolsa hermética, con guantes y mascarilla

¿Qué hago si?

- **Piel seca, picor:** Utilice cremas hidratantes, jabón suave, no utilice agua caliente ni se exponga al sol.
- **Ojos secos:** Utilice lágrimas artificiales o suero fisiológico para mantener la hidratación
- **Cansancio o sueño alterado:** Haga ejercicio suave, evite bebidas estimulantes (cafeína, te, etc).
- **Pelo frágil:** Evite tintes, permanentes y calor excesivo en lavado y secado.
- **Nauseas, diarrea:** Siga una dieta ligera repartida en 5 tomas diarias. Tome agua abundante en pequeños sorbos. En caso de sabor metálico, utilice utensilios de plástico o tome caramelos de sabor fuerte (menta o chocolate). Evite el alcohol o cafeína.
- **Artas bucales:** utilice cepillos suaves y colutorios acuosos-viscosos tras cada comida.