



Afatinib

Giotrif® 20, 30, 40, 50 mg. Frasco 30 comprimidos

¿Qué es y para que se utiliza?

Afatinib es un citostático indicado en el tratamiento de neoplasias.

¿Cómo conservar?

Afatinib debe conservarse a temperatura inferior a 25°C en su embalaje original protegido de la humedad.

¿Cómo se administra?

Tomar siempre **en ayunas**, no ingerir alimentos al menos una hora antes ni tres horas después. Tragar los comprimidos enteros (no triturar ni partir) con un vaso de agua.

Si los comprimidos no se pueden tragar enteros, se pueden dispersar en aproximadamente 100 ml de agua no carbonatada. No se deben utilizar otros líquidos. Se debe echar el comprimido en el agua sin tritularlo y se debe remover el vaso de vez en cuando durante unos 15 minutos hasta que se haya disuelto en partículas muy pequeñas. La dispersión debe consumirse inmediatamente. El vaso se debe enjuagar con unos 100 ml de agua que deben beberse también. La dispersión puede ser administrada también a través de una sonda gástrica.

¿Qué hacer si olvida una dosis?

Tómela lo antes posible, excepto si falta menos de 8 horas para la próxima dosis. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis. Nunca tome una dosis doble para compensar el olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: aumento de riesgo de infecciones, disminución de apetito, síndrome mano-pies (palmas y plantas enrojecidas), conjuntivitis o sequedad ocular. Ante la presencia de otro síntoma, avise a su médico o farmacéutico.

Observaciones:

Afatinib puede interactuar con otros medicamentos pudiendo perder eficacia o provocar la aparición de efectos adversos. Comunique a su médico otros medicamentos o suplementos dietético o



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA.
SERVICIO DE FARMACIOA
HOSPITAL DE LA LINEA
AGSCG ESTE



956969276



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



Horario:
- Lunes a viernes
de 8.30 – 18:00h

producto natural que esté tomando.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz. En caso de quedar embarazada, informe a su médico.

Se debe interrumpir la lactancia antes de iniciar el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa

Advertencias

- Conservar en nevera (2-8°C). **NO CONGELAR**



- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Las plumas administradas no las deseche en la basura doméstica. Tirelo en un contenedor rígido para objetos punzantes y llévelas a cualquier punto SIGRE.



- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico