



# Alpelisib 200/50 mg

Piqray®

## ¿Qué es y para que se utiliza?

Fármaco utilizado en el tratamiento de carcinoma de mama.

## ¿Cómo conservar?

Alpelisib debe conservarse a temperatura inferior a 25°C en su embalaje original protegido de la humedad.

## ¿Cómo se administra?

Tomar siempre **con comidas (preferentemente en el desayuno)**. Tragar comprimidos enteros (no triturar ni partir) con un vaso de agua.

## ¿Qué hacer si olvida una dosis?

En caso de olvido, tómela inmediatamente si quedan menos de 9 horas hasta la próxima dosis. En caso de olvido nunca duplique una dosis, y la siguiente dosis tómela a su hora habitual.

## ¿Qué hacer si vomita?

En caso de que vomite, no repetir la toma.

## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: náuseas, vómitos, erupción cutánea, diarrea e hiperglucemia.

## Observaciones:

Alpelisib puede interactuar con otros medicamentos pudiendo perder eficacia o provocar la aparición de efectos adversos. Comunique a su médico otros medicamentos o suplementos dietético o producto natural que esté tomando. No tomar hierba de San Juan (Hypericum). Precaución a la hora de tomar cualquier medicamento que pueda modificar pH gástrico como: ranitidina, omeprazol, etc.

## Excipientes de declaración obligatoria

LACTOSA.

No debe tomar este medicamento los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa o problemas de absorción de glucosa o galactosa.



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA  
SERVICIO DE FARMACIA  
HOSPITAL SAS LA LINEA



697958259  
956969276



[atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es](mailto:atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es)



Horario:

- PRESENCIAL:  
Lunes a Viernes:  
8.30 – 14.30h
- TELECONSULTA:  
Miércoles de  
16.00 – 19.40h



## Advertencias

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.

## Recomendaciones especiales

### Manipulación Medicamentos especiales:



- Lávese las manos antes y después de manipular la medicación.
- Extraiga los comprimidos o capsulas del envase en el momento de la administración. No conserve en pastilleros o dispositivos similares fuera de su envase.
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua sin masticar, triturar ni chupar.
- En caso que requiera triturar o fraccionar, hagalo dentro de una bolsa hermética, con guantes y mascarilla



### ¿Qué hago si?

- **Piel seca, picor:** Utilice cremas hidratantes, jabón suave, no utilice agua caliente ni se exponga al sol.
- **Ojos secos:** Utilice lágrimas artificiales o suero fisiológico para mantener la hidratación
- **Cansancio o sueño alterado:** Haga ejercicio suave, evite bebidas estimulantes (cafeína, te, etc).
- **Pelo frágil:** Evite tintes, permanentes y calor excesivo en lavado y secado.
- **Nauseas, diarrea:** Siga una dieta ligera repartida en 5 tomas diarias. Tome agua abundante en pequeños sorbos. En caso de sabor metálico, utilice utensilios de plástico o tome caramelos de sabor fuerte (menta o chocolate). Evite el alcohol o cafeína.
- **Aftas bucales:** utilice cepillos suaves y colutorios acuosos-viscosos tras cada comida.