



Baricitinib

Olumiant® 2 mg y 4 mg. 28 comprimidos

¿Qué es y para que se utiliza?

Baricitinib es fármaco indicado en el tratamiento de la artritis reumatoide activa en adultos.

¿Cómo conservar?

Conservar los comprimidos en su embalaje original protegido de la luz y a una temperatura no superior a 25°C.

¿Cómo se administra?

Baricitinib debe tomarse vía oral, con o sin alimento, una vez al día. Trague el comprimido entero, sin masticar, con un poco de agua.

¿Qué hacer si olvida una dosis?

En caso de olvido, tómela tan pronto como sea posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada. Nunca tome doble dosis para compensar el olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos secundarios más frecuentes son: infecciones (respiratorias, urinarias, herpéticas, digestiva), elevación del colesterol, náuseas y diarreas.

Awise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Observaciones:

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Baricitinib. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Si presenta una infección activa (como gripe, tuberculosis, etc), debe suspender temporalmente el tratamiento e informar a su médico o farmacéutico. Informe a su médico si ha padecido hepatitis B o C. Algunas vacunas están contraindicadas durante el tratamiento. Consulte con su médico antes de ser vacunado.

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada, informe a su médico. Del mismo modo, no se recomienda la lactancia materna durante el tratamiento.



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA.
SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL DE LA LINEA
AGSCG ESTE



956969276



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



Horario: Lunes a Viernes
de 8.00 – 18.00h


Excipientes de declaración obligatoria

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por comprimido; esto es, esencialmente "exento de sodio".

Identificación

Comprimido con zona ahuecada en cada cara:

- Olumiant 2 mg: Comprimidos de forma oblonga, de 9,0 x 7,5 mm, de color rosa claro, grabados con "Lilly" en una cara y "2" en la otra.
- Olumiant 4 mg: Comprimidos redondos de 8,5 mm, de color rosa de intensidad media, grabados con "Lilly" en una cara y "4" en la otra.



Advertencias

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Las plumas administradas no las deseche en la basura doméstica. Téilo en un contenedor rígido para objetos punzantes y llévelas a cualquier punto SIGRE.



- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico