



# Benznidazol

**Abarax® 100 mg, 100 cápsulas.**

## ¿Qué es y para que se utiliza?

Fármaco indicado para la infección por el parásito *Trypanosoma* que causa la llamada Enfermedad de Chagas, transmitida por la picadura de un insecto o por transmisión madre-hijo.

También se utiliza para la prevención de la reactivación de *Trypanosoma cruzi* en pacientes trasplantados o en tratamiento con inmunosupresores.

## ¿Cómo conservar?

Conservar en su embalaje original protegido de la luz y a una temperatura no superior a 25°C.

## ¿Cómo se administra?

Benznidazol debe tomarse vía oral, con o sin alimento, habitualmente dos veces al día durante 60 días. Trague la cápsula entera, sin abrir, con un poco de agua.

## ¿Qué hacer si olvida una dosis?

En caso de olvido, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada. Nunca tome dosis doble para compensar el olvido.

## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: erupción en la piel, náuseas, hormigueo, infecciones, sangrados o hematomas.

Si percibe cualquier otro efecto que le preocupe, consulte con su médico o farmacéutico.



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA  
SERVICIO DE FARMACIA  
HOSPITAL DE LA LINEA  
AGSCG ESTE




956969276



[atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es](mailto:atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es)



Horario: Lunes a Viernes:  
de 8.00 – 18.00h



## Observaciones:

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Benznidazol. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Informe a su médico si toma los siguientes medicamentos:

- Acido salicílico: podría aumentar el riesgo de sangrado.
- Anticoagulantes: Su efecto puede verse potencia con Benznidazol.

No debe tomar alcohol cuando se encuentre en tratamiento con Benznidazol por riesgo de calambres abdominales, náuseas, vómitos, dolor de cabeza o ruborización.

Informe a su médico en caso de embarazo o lactancia materna, para que le indiquen las precauciones, ya que es preferible evitar el uso de Benznidazol en dichas circunstancias.

## Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa  
Almidón de maíz

## Identificación

- Comprimidos birranurados.

## Advertencias

---

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

