



Bexaroteno 100 cápsulas

Tangretin® 75 mg cápsulas

¿Qué es y para que se utiliza?

Fármaco utilizado en el tratamiento de las manifestaciones cutáneas del linfoma cutáneo de células T.

¿Cómo conservar?

Bexaroteno debe conservarse a temperatura inferior a 25°C en su embalaje original protegido de la humedad.

¿Cómo se administra?

El cálculo de la dosis será ajustado según superficie corporal del paciente por lo que el número de cápsulas por día puede variar. Tomar con comidas. Tragar las cápsulas enteras (no abrir) con un vaso de agua.

¿Qué hacer si olvida una dosis?

En caso de olvido, tómela inmediatamente si quedan más de 12 horas hasta la próxima dosis. En caso de vómitos nunca duplique una dosis, y la siguiente dosis tómela a su hora habitual.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: Aumento de colesterol o triglicéridos, picor o erupción de la piel, dolor de cabeza o astenia. Menos frecuente: mareo, ojo seco, diarrea, náuseas o vómitos.

Observaciones:

Bexaroteno puede interactuar con otros medicamentos pudiendo perder eficacia o provocar la aparición de efectos adversos. Comunique a su médico otros medicamentos o suplementos dietético o producto natural que esté tomando. No tomar hierba de San Juan (Hypericum) o zumo de pomelo.

Excipientes de declaración obligatoria

Sorbitol.



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA
SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL DE LA LINEA
AGSCG ESTE



956969276



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



Horario:

- PRESENCIAL:
Lunes a Viernes:
8.30 – 18:00h



Advertencias

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.

Recomendaciones especiales

Manipulación Medicamentos especiales:

- Lávese las manos antes y después de manipular la medicación.
- Extraiga los comprimidos o capsulas del envase en el momento de la administración. No conserve en pastilleros o dispositivos similares fuera de su envase.
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua sin masticar, triturar ni chupar.
- En caso que requiera triturar o fraccionar, hagalo dentro de una bolsa hermética, con guantes y mascarilla



¿Qué hago si?

- **Piel seca, picor:** Utilice cremas hidratantes, jabón suave, no utilice agua caliente ni se exponga al sol.
- **Ojos secos:** Utilice lágrimas artificiales o suero fisiológico para mantener la hidratación.
- **Cansancio o sueño alterado:** Haga ejercicio suave, evite bebidas estimulantes (cafeína, te, etc).
- **Pelo frágil:** Evite tintes, permanentes y calor excesivo en lavado y secado.
- **Nauseas, diarrea:** Siga una dieta ligera repartida en 5 tomas diarias. Tome agua abundante en pequeños sorbos. En caso de sabor metálico, utilice utensilios de plástico o tome caramelos de sabor fuerte (menta o chocolate). Evite el alcohol o cafeína.
- **Aftas bucales:** utilice cepillos suaves y colutorios acuosos-viscosos tras cada comida.

