



Bictegravir / Emtricitabina Tenofovir alafenamida



Biktarvy® 50 / 200 / 25 mg, comprimidos recubiertos

¿Qué es y para que se utiliza?

Combinación de 3 fármacos antirretrovirales: un inhibidor de la integrasa (bictegravir) y dos inhibidores de la transcriptasa inversa (Emtricitabina y tenofovir alafenamida) indicados para el tratamiento de la infección por el VIH

¿Cómo conservar?

Biktarvy® debe conservarse a temperatura inferior a 25°C en su embalaje original protegido de la humedad.

¿Cómo se administra?

Debe tomar un comprimido al día, con o sin alimentos. Debe tragarlo entero con un vaso de agua, sin masticar, triturar ni partir.

¿Qué hacer si olvida una dosis?

En caso de olvido, tómelo inmediatamente, salvo que falte menos de 6 horas para la siguiente toma. Nunca duplique la dosis para compensar el olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: trastorno del sueño, dolor de cabeza, mareos, náuseas, diarrea, erupción en la piel y cansancio.

Si percibe cualquier otro efecto que le preocupe, consulte con su médico o farmacéutico.



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACÉUTICA
SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL DE LA LINEA
AGSCG ESTE



956969276



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



Horario: Lunes a Viernes:
de 8.00 – 18.00h

Observaciones:

Biktarvy® puede interactuar con otros medicamentos, suplementos dietéticos o productos naturales, por lo que no tome ningún otro medicamento sin consultarlo con su médico o farmacéutico. Biktarvy® está contraindicado con zumo de pomelo, hierba de san Juan, rifampicina, carbamazepina, fenobarbital, fenitoina o sucralfato.

En caso de tomar antiácidos con magnesio/aluminio o suplementos de hierro evite tomarlo al mismo tiempo que Biktarvy® espaciando las tomas 2 horas.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe a su médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.

Biktarvy® contiene un medicamento para tratar la hepatitis B. Si usted tiene esta enfermedad, dejarlo de tomar bruscamente podría causar una hepatitis por reactivación del virus de la hepatitis B.

Excipientes de declaración obligatoria

Ninguno

Identificación

BIKTARVY® se presenta en un frasco que contiene 30 comprimidos recubiertos con película, de color marrón purpúreo, marcado en una de las caras del comprimido con GSI y en la otra cara del comprimido 9883. Cada comprimido mide aproximadamente 15 mm x 8 mm

Advertencias

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

Recomendaciones especiales

- El éxito de su tratamiento dependerá del correcto cumplimiento. No deje de tomar su medicación sin consultar con su médico o farmacéutico.
- Mantenga siempre las medidas de prevención de contagio del virus hacia otras personas.