



# Cannabis sativa



Sativex® oromucosal. 3 viales spray

## ¿Qué es y para que se utiliza?

Fármaco utilizado para mejorar la espasticidad moderada o grave en pacientes con esclerosis múltiple.

## ¿Cómo conservar?

Sativex® debe conservarse en **nevera** (entre 2-8°C). No congelar. Conservar el vial en el embalaje exterior para proteger de la luz. Una vez abierto el envase pulverizador, no es necesaria su conservación en nevera, pero debe conservarse a una temperatura inferior a 25°C.

## ¿Cómo se administra?

Es una solución que debe pulverizarse en la superficie bucal alternando el lugar de aplicación en cada administración.

El número de pulverizaciones variará según las necesidades del paciente. El número de pulverizaciones aumentará gradualmente hasta conseguir la respuesta deseada (max. 12 pulverizaciones/día).

- Dosis de la mañana: entre la hora de levantarse y mediodía
- Dosis de la noche: entre las 16.00h y la hora de acostarse.

Día	Pulverizaciones mañana	Pulverizaciones noche
1	0	1
2	0	1
3	0	2
4	0	2
5	1	2
6	1	3
7	1	4
8	2	4
9	2	5
10	3	5
11	3	6
12	4	6
13	4	7
14	5	7



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA.

SERVICIO DE FARMACIA  
HOSPITAL SAS LA LINEA  
AGSCG ESTE



956969276



[atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es](mailto:atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es)



Horario: Lunes a Viernes  
de 8.00-18.00h

### ¿Qué hacer si olvida una dosis?

En caso de olvido, adminístrese la dosis tan pronto como sea posible, excepto si está próxima la siguiente dosis. Nunca se administre doble dosis para compensar el olvido.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: mareos, somnolencia, cansancio, ansiedad y/o cambios de ánimo. Ocurre principalmente en las primeras semanas pero remiten en días si sigue la pauta de aumento progresivo. Es importante vigilar estos síntomas y comunicarlo a su médico o farmacéutico.

### Observaciones:

Sativex® puede interaccionar con otros medicamentos pudiendo perder eficacia o provocar la aparición de efectos adversos. Comunique a su médico otros medicamentos o suplementos dietético o producto natural que esté tomando.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz. En caso de quedar embarazada, informe a su médico. Sativex® se excreta en leche materna, por lo que no debe administrar el tratamiento durante la lactancia

### Excipientes de declaración obligatoria

Etanol  
propilenglicol

## Advertencias

- **Conservar en nevera (2-8°C). NO CONGELAR**



- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Las viales utilizados no los deseche en la basura doméstica. Llévelas a cualquier punto SIGRE.



- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**