



Cladribina



Mavenclad® 10 mg. 1 comprimido

¿Qué es y para que se utiliza?

Fármaco indicado para el tratamiento de la esclerosis múltiple recurrente.

¿Cómo conservar?

Conservar las cápsulas en su embalaje original protegido de la luz y a una temperatura no superior a 25°C.

¿Cómo se administra?

Cladribina debe tomarse vía oral, con o sin alimento, habitualmente a la misma hora. Tragar el comprimido entero, sin masticar ni triturar, con un poco de agua.

El tratamiento consiste en 1 ciclo anual de 4 o 5 días durante 2 años consecutivos. La dosis y duración del ciclo será decidido por su médico.

Lávese las manos tras la manipulación de los comprimidos.

¿Qué hacer si olvida una dosis?

En caso de olvido, tome la dosis tan pronto como sea posible, excepto si falta menos de 12 horas para la siguiente dosis.

Nunca tome doble dosis para comenzar el olvido y siga el horario habitual de su tratamiento, ampliando un día más la duración de su tratamiento.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: disminución de defensas y aumento de infecciones (habitualmente herpes oral o zoster en banda), erupción cutánea y pérdida de cabello.

En caso de padecer cualquier síntoma que le preocupe, consulte con su médico o farmacéutico.



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA.
SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL DE LA LINEA
AGSCG ESTE



956969276



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



Horario: Lunes a Viernes
de 8.00-18.00h

Observaciones:

Cladribina puede interactuar con otros medicamentos pudiendo perder eficacia o provocar la aparición de efectos adversos. Comunique a su médico otros medicamentos o suplementos dietético o producto natural que esté tomando.

Cladribina está contraindicado en pacientes en tratamiento con inmunosupresores, vacunas vivas o atenuadas, por alto riesgo de infecciones.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con cladribina y hasta 6 meses después de su finalización. La lactancia materna está contraindicada durante el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Sorbitol

Identificación

Mavenclad® 10 mg se presenta en forma de comprimido blancos, redondos, convexos, grabados con "C" en una cara y "10" en la otra.



Advertencias

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.

