



Cobimetinib

Cotellic® 20 mg comprimidos

¿Qué es y para que se utiliza?

Fármaco antineoplásico, que impide la proliferación celular, utilizado junto con Vemurafenib en el tratamiento del melanoma.

¿Cómo conservar?

Conservar los comprimidos en su embalaje original protegido de la luz y a una temperatura no superior a 25°C.

¿Cómo se administra?

Cobimetinib debe tomarse vía oral, **con o sin alimento**. Tome siempre a la misma hora. Trague los comprimidos enteros, sin triturar, masticar ni partir.

La dosis habitual es 60 mg (3 comprimidos de 20 mg), pero la dosis puede ser ajustada según tolerancia del paciente. La medicación habrá que tomarla de forma ininterrumpida.

¿Qué hacer si olvida una dosis?

No tome la dosis olvidada y continúe su tratamiento con normalidad. En caso de vómito, no tome una nueva dosis ese día y continúe su tratamiento con normalidad.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: Fatiga, alteraciones visuales, hipertensión, diarrea, náuseas, vómitos, fotosensibilidad, reacciones dérmicas y hemorragia.

Observaciones:

Vemurafenib puede interaccionar con otros medicamentos pudiendo perder eficacia o provocar la aparición de efectos adversos. Comunique a su médico otros medicamentos o suplementos dietético o producto natural que esté tomando.

Informe a su médico si padece de alguna enfermedad cardíaca o pulmonar antes de iniciar el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa.



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACÉUTICA
SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL DE LA LINEA
AGSCG ESTE



956969276



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



Horario:

- PRESENCIAL:
Lunes a Viernes:
8.30 – 18:00h



Advertencias

- Se recomienda el uso de protección sola UVA/UVB en piel y labios y el uso de ropa protectora
- No tomar Hierba de San Juan ni zumo de pomelo.
- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

Recomendaciones especiales

Manipulación Medicamentos especiales:

- Lávese las manos antes y después de manipular la medicación.
- Extraiga los comprimidos o capsulas del envase en el momento de la administración. No conserve en pastilleros o dispositivos similares fuera de su envase.
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua sin masticar, triturar ni chupar.
- En caso que requiera triturar o fraccionar, hagalo dentro de una bolsa hermética, con guantes y mascarilla



¿Qué hago si?

- **Piel seca, picor:** Utilice cremas hidratantes, jabón suave, no utilice agua caliente ni se exponga al sol.
- **Ojos secos:** Utilice lágrimas artificiales o suero fisiológico para mantener la hidratación
- **Cansancio o sueño alterado:** Haga ejercicio suave, evite bebidas estimulantes (cafeína, te, etc).
- **Pelo frágil:** Evite tintes, permanentes y calor excesivo en lavado y secado.
- **Nauseas, diarrea:** Siga una dieta ligera repartida en 5 tomas diarias. Tome agua abundante en pequeños sorbos. En caso de sabor metálico, utilice utensilios de plástico o tome caramelos de sabor fuerte (menta o chocolate). Evite el alcohol o cafeína.
- **Aftas bucales:** utilice cepillos suaves y colutorios acuosos-viscosos tras cada comida.

