



Dabrafenib

Tafinlar® 50, 75 mg comprimidos

¿Qué es y para que se utiliza?

Fármaco utilizado en monoterapia o en combinación con trametinib para el tratamiento de pacientes adultos con melanoma.

¿Cómo conservar?

Dabrafenib debe conservarse a temperatura inferior a 25°C en su embalaje original protegido de la humedad.

¿Cómo se administra?

Tomar siempre **en ayunas**, no ingerir alimentos dos horas antes ni una hora después. Tragar comprimidos enteros (no triturar ni partir) con un vaso de agua. No abra ni rompa las capsulas, ya que perderán su efecto. Se recomienda tomar siempre a la misma hora, dejando un intervalo de 12 horas entre dosis. Si vomita después de tomar dabrafenib, no repita la toma y espere a la siguiente dosis.

¿Qué hacer si olvida una dosis?

En caso de olvido, tómela inmediatamente, salvo si han transcurrido más de 18 horas desde la última toma. Nunca duplique la dosis para compensar el olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: erupción en la piel, enrojecimiento de las palmas de las manos, hipertensión, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, escalofríos, cansancio, fiebre, dolor muscular y articular, tos, pérdida de cabello y falta de apetito. Otros efectos: piel seca y escamosa y cambios en la visión. Precaución en la conducción por fatiga o problemas visuales.

Observaciones:

Dabrafenib puede interactuar con otros medicamentos pudiendo perder eficacia o provocar la aparición de efectos adversos. Los inhibidores de la bomba de protones como **omeprazol**, puede disminuir el efecto de dabrafenib. Comunique a su médico otros medicamentos o suplementos dietético o producto natural que esté tomando. No tomar hierba de San Juan (Hypericum)

Excipientes de declaración obligatoria

PROPILENGLICOL



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACÉUTICA
SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL DE LA LINEA
AGSCG ESTE



956969276



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es

Horario:

- PRESENCIAL:
Lunes a Viernes:
8.30 – 18:00



Advertencias

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

Recomendaciones especiales

Manipulación Medicamentos especiales:



- Lávese las manos antes y después de manipular la medicación.
- Extraiga los comprimidos o capsulas del envase en el momento de la administración. No conserve en pastilleros o dispositivos similares fuera de su envase.
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua sin masticar, triturar ni chupar.
- En caso que requiera triturar o fraccionar, hagalo dentro de una bolsa hermética, con guantes y mascarilla



¿Qué hago si?

- **Piel seca, picor:** Utilice cremas hidratantes, jabón suave, no utilice agua caliente ni se exponga al sol.
- **Ojos secos:** Utilice lágrimas artificiales o suero fisiológico para mantener la hidratación
- **Cansancio o sueño alterado:** Haga ejercicio suave, evite bebidas estimulantes (cafeína, te, etc).
- **Pelo frágil:** Evite tintes, permanentes y calor excesivo en lavado y secado.
- **Nauseas, diarrea:** Siga una dieta ligera repartida en 5 tomas diarias. Tome agua abundante en pequeños sorbos. En caso de sabor metálico, utilice utensilios de plástico o tome caramelos de sabor fuerte (menta o chocolate). Evite el alcohol o cafeína.
- **Aftas bucales:** utilice cepillos suaves y colutorios acuosos-viscosos tras cada comida.