



Denosumab

Xgeva® 120 mg. Vial 1,7 ml de un solo uso

¿Qué es y para que se utiliza?

Fármaco utilizado para la prevención de alteraciones relacionadas con el esqueleto en adultos con metástasis óseas de tumores sólidos

¿Cómo conservar?

Denosumab debe conservarse en **nevera** (entre 2-8°C). No congelar. Conservar el vial en el embalaje exterior para proteger de la luz.

¿Cómo se administra?

La dosis habitual es de 120 mg e una inyección subcutánea cada 4 semanas en el muslo, abdomen o parte superior del brazo. No agitar excesivamente y administrar lentamente el contenido. Para evitar molestias en la inyección, dejar que el vial alcance la temperatura ambiente antes de administrarlo.

¿Qué hacer si olvida una dosis?

Consulte con su médico o farmacéutico

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: dolor muscular, cansancio, diarrea, aumento de sudoración y/o disminución de calcio o fosfato en sangre. Ante la presencia de otro síntoma, avise a su médico o farmacéutico.

Observaciones:

Denosumab puede interactuar con otros medicamentos pudiendo perder eficacia o provocar la aparición de efectos adversos. Comunique a su médico otros medicamentos o suplementos dietético o producto natural que esté tomando. No se debe combinar denosumab con bifosfonatos. Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz. En caso de quedar embarazada, informe a su médico. Se desconoce si denosumab se excreta en leche materna, por lo que se recomienda interrumpir la lactancia antes de iniciar el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Ninguno



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA.
SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL DE LA LINEA
AGSCG ESTE



956969276



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



Horario: Lunes a Viernes
de 8:30h a 18:00 h

Advertencias

- Conservar en nevera (2-8°C). **NO CONGELAR**



- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Las plumas administradas no las deseche en la basura doméstica. Tírelo en un contenedor rígido para objetos punzantes y llévelas a cualquier punto SIGRE.



- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico