



# Dupilumab

Dupilumab® 300 mg. Jeringa o pluma precargada

## ¿Qué es y para que se utiliza?

Dupilumab es un agente biológico indicado en el tratamiento de la dermatitis atópica y asma grave.

## ¿Cómo conservar?

Conservar en **NEVERA** (entre 2 y 8°C). No congelar.

Si por accidente la medicación quedara fuera de la nevera o se congelara, no la deseche y consulte al farmacéutico.

## ¿Cómo se administra?

Dupilumab se administra vía subcutánea (bajo la piel). La dosis inicial recomendada es 600 mg (2 unidades) y continuar con una dosis de mantenimiento 300 mg (1 unidad) cada 15 días.

Se administra de la siguiente manera:

1. Saque la medicación de la nevera 30 minutos antes para que se atempere. No retirar el tapón ni agitar.
2. Lávese las manos con agua y jabón.
3. Seleccione la zona de inyección (muslo, abdomen al menos a 5 cm del ombligo o parte posterior del brazo), evite zonas con dolor, amoratadas o endurecidas. Cambiando el punto de inyección en cada administración
4. Desinfecte la piel con algodón y alcohol 70°.
5. Pellizque la piel entre los dedos pulgar e índice sin apretar e introduzca la aguja en toda su longitud con ángulo de 45°. En el caso de la pluma colóquela en el punto de inyección a 90°.
6. Presione lentamente el embolo de la jeringa hasta administrar toda la medicación, manteniendo la piel pellizcada. En el caso de la pluma presione el aro inferior amarillo en la zona de inyección
7. Al terminar la inyección saque la aguja y suelte la piel.
8. Presión la piel con algodón durante unos segundos.
9. Tire la jeringa a un contenedor de objetos punzantes.



**CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA.**  
SERVICIO DE FARMACIA  
HOSPITAL DE LA LINEA  
AGSCG ESTE



956969276



[atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es](mailto:atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es)



Horario: Lunes a Viernes  
de 8.00 – 18.00h

### ¿Qué hacer si olvida una dosis?

Si olvida una dosis, deberá administrársela tan pronto como lo recuerde y continúe con la pauta de una administración cada 15 días. Nunca se administre una dosis doble para compensar un olvido.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos secundarios más frecuentes son: infección de vías respiratorias, conjuntivitis, herpes oral, dolor muscular hipertensión o reacción en el punto de inyección (picor, erupción, enrojecimiento)

Avise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

### Observaciones:

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de dupilumab. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Si presenta una infección activa (como gripe), debe suspender temporalmente el tratamiento e informar a su médico o farmacéutico. Algunas vacunas están contraindicadas durante el tratamiento. Consulte con su médico antes de ser vacunado.

### Excipientes de declaración obligatoria

Ninguno

## Advertencias

---

**Conservar en nevera (2-8°C). NO CONGELAR**

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Las plumas administradas no las deseche en la basura doméstica. Ténelo en un contenedor rígido para objetos punzantes y llévelas a cualquier punto SIGRE.



- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.