



## Entecavir

Entecavir EFG® 0,5 mg y 1 mg, 30 comprimidos

### ¿Qué es y para que se utiliza?

Es un antivírico que impide la replicación viral, utilizado en el tratamiento de la Hepatitis B para mantener la carga viral indetectable.

### ¿Cómo conservar?

Entecavir debe conservarse a temperatura inferior a 25°C en su embalaje original protegido de la humedad.

### ¿Cómo se administra?

Debe tomar un comprimido al día, sin alimentos (30 minutos antes o 2 horas después de las comidas). Debe tragarlo entero con un vaso de agua, sin masticar, triturar ni partir.

### ¿Qué hacer si olvida una dosis?

En caso de olvido, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada. Nunca tome dosis doble para compensar el olvido.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: insomnio, somnolencia, cansancio, dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos y mareos.

Si aparecen estos síntomas de hipersensibilidad o cualquier otro síntoma que le preocupe, comuníquese a su médico o farmacéutico.

### Observaciones:

Entecavir puede interactuar con otros medicamentos, suplementos dietéticos o productos naturales, por lo que no tome ningún otro medicamento sin consultarlo con su médico o farmacéutico.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe a su médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.



**CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA**  
SERVICIO DE FARMACIA  
HOSPITAL DE LA LINEA  
AGSCG ESTE



956969276



[atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es](mailto:atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es)



Horario: Lunes a Viernes:  
de 8.00 – 18.00h

## Excipientes de declaración obligatoria

Almidón de maíz.

## Identificación

Las presentaciones de Entecavir son diversas dada la comercialización por distintos laboratorios farmacéuticos.

## **Advertencias**

---

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

## **Recomendaciones especiales**

---

- El éxito de su tratamiento dependerá del correcto cumplimiento. No deje de tomar su medicación sin consultar con su médico o farmacéutico.
- Mantenga siempre las medidas de prevención de contagio del virus hacia otras personas.

