



# Sofosbuvir / Velpatasvir

Epclusa® 400/100 mg, comprimidos recubiertos

## ¿Qué es y para que se utiliza?

Epclusa® es un antiviral indicado para el tratamiento de hepatitis C.

## ¿Cómo conservar?

Epclusa® debe conservarse a temperatura inferior a 25°C en su embalaje original protegido de la humedad.

## ¿Cómo se administra?

Debe tomar **un comprimido al día**, con o sin alimentos. Debe tragarlo entero con un vaso de agua, sin masticar, triturar ni partir.

## ¿Qué hacer si olvida una dosis?

En caso de olvido, tómelo inmediatamente, salvo que falte menos de 18 horas para la siguiente toma. Nunca duplique la dosis para compensar el olvido.

Si vomita en 1 hora tras el tratamiento, tómese otra dosis, pero si ya ha pasado 1 hora, no es necesario repetir la dosis.

## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: diarrea, dolor de cabeza, insomnio y debilidad.

Informe a su médico si percibe cualquier otro efecto que le preocupe.

## Observaciones:

Epclusa® está contraindicado con hierba de san Juan, amiodarona (antiarrítmico), oxcarbazepina (epilepsia), tenofovir (VIH/VHB), efavirenz (VIH), rosuvastatina u otras estatinas (colesterol).

En caso de tratamiento con antiulcerosos del tipo inhibidores de la bomba de protones (**omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol**), Epclusa® se debe tomar con alimentos 4 horas antes de tomar el tratamiento antiulceroso.

Las vitaminas, minerales (hierro, calcio) y los antiácidos con magnesio/aluminio deben tomarse 4 horas antes o 4 horas después de Epclusa®. Los antiácidos tipo anti-H2 (ranitidina, famotidina, etc) deben ser sustituidos o ajustados por su médico.

Comuníquese a su médico/farmacéutico todos los medicamentos que está tomando para el estudio de posibles interacciones.



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA  
SERVICIO DE FARMACIA  
HOSPITAL DE LA LINEA  
AGSCG ESTE



956969276



[atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es](mailto:atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es)



Horario: Lunes a Viernes:  
de 8.00 – 18.00h

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe a su médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.

### Excipientes de declaración obligatoria

Ninguno.

### Identificación

Eplusa® se presenta en comprimido recubierto con película de color rosado y forma de rombo, con unas dimensiones de 20 mm x 10 mm y con «GSI» grabado por un lado y «7916» por el otro.



## Advertencias

---

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

## Recomendaciones especiales

---

- El éxito de su tratamiento dependerá del correcto cumplimiento. No deje de tomar su medicación sin consultar con su médico o farmacéutico.
- Mantenga siempre las medidas de prevención de contagio del virus hacia otras personas.