



Epoetina Alfa

Binocrit® 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10.000 UI
jeringa precargada.

¿Qué es y para que se utiliza?

La epoetina alfa es una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos, que transporta oxígeno y energía a los tejidos. Esta hormona es fabricada principalmente en los riñones por ello, en caso de insuficiencia renal, se reduce el número de glóbulos rojos ocasionando anemia.

¿Cómo conservar?

Binocrit® debe conservarse en nevera entre 2-8°C. No congelar

¿Cómo se administra?

La dosis y la frecuencia de administración podrá variar durante su tratamiento y dependerá del seguimiento clínico realizado por su médico. Binocrit® se administra vía subcutánea de la siguiente manera:

1. Saque la jeringa de la nevera 30 minutos para que se atempere. No retirar el tapón ni agitar.
2. Lávese las manos con agua y jabón.
3. Seleccione la zona de inyección (muslo, abdomen al menos a 5 cm del ombligo o parte posterior del brazo), evite zonas con dolor, amoratadas o endurecidas. Cambiando el punto de inyección en cada administración
4. Desinfecte la piel con algodón y alcohol 70°.
5. Pellizque la piel entre los dedos pulgar e indica sin apretar e introduzca la aguja en toda su longitud con ángulo de 45°.
6. Presione lentamente el embolo de la jeringa hasta administrar toda la medicación, manteniendo la piel pellizcada.
7. Al terminar la inyección saque la aguja y suelte la piel.
8. Presión la piel con algodón durante unos segundos.
9. Tire la jeringa a un contenedor de objetos punzantes.



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA
SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL DE LA LINEA
AGSCG ESTE



956969276



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



Horario: Lunes a Viernes:
de 8.00 – 18.00h

¿Qué hacer si olvida una dosis?

En caso de olvido, adminístresela inmediatamente, excepto si queda menos tiempo para la siguiente dosis que el transcurrido desde la dosis olvidada. Nunca duplique la dosis para compensar el olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: hipertensión arterial, cefalea, malestar general, cansancio, formación de coágulos en sangre y reacción de la zona de inyección (prurito, erupción, enrojecimiento).

Si percibe cualquier otro efecto que le preocupe, consulte con su médico o farmacéutico.

Observaciones:

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de epoetina alfa. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Informe a su médico en caso de embarazo o lactancia materna, para que le indiquen las precauciones.

Excipientes de declaración obligatoria

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por jeringa precargada, esto es, esencialmente "exento de sodio"

Identificación

Binocrit® se presenta como una solución inyectable transparente e incolora, para inyección en una jeringa precargada. Las jeringas están selladas en un blister.

Advertencias

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

