



## Erenumab



Aimovig® 70 mg, pluma precargada de un solo uso.

### ¿Qué es y para que se utiliza?

Anticuerpo monoclonal indicado en migraña crónica refractaria a otros tratamientos de elección.

Aimovig® debe conservarse en nevera entre 2-8°C. No congelar

### ¿Cómo se administra?

La dosis de inicio es de 70 mg (1 pluma) cada 4 semanas. Se administra vía subcutánea de la siguiente manera:

1. Saque la pluma de la nevera 15 minutos para que se atempere. No agitar.
2. Lávese las manos con agua y jabón.
3. Seleccione la zona de inyección (muslo, abdomen o en la parte externa de la parte superior de los brazos), evite zonas con dolor, amoratadas o endurecidas.
4. Desinfecte la piel con algodón y alcohol 70°.
5. Retire el capuchón blanco de la pluma sin tocar el protector verde.
6. Pellizque la zona de piel limpia con firmeza.
7. Coloque el protector amarillo de la pluma en ángulo recto respecto a la piel pellizcada de forma que pueda ver la ventana y presione con firmeza la pluma contra el cuerpo hasta que el protector amarillo de seguridad ya no quede a la vista.
8. Con su dedo índice o pulgar presione el botón pulsador gris, oirá un "click" y sentirá un pinchazo.
9. Mantenga presionando contra la piel 15 segundos para asegurar la inyección completa. Oirá un "click" La ventana de inspección debe haber pasado a color amarillo.
10. Saque la pluma del lugar de inyección en línea recta.
11. Puede que vea una gota de sangre en el lugar de inyección. Limpie con un algodón suavemente, pero sin frotar.



**CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA**  
SERVICIO DE FARMACIA  
HOSPITAL SAS LA LINEA





956969276  
697958259



[atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es](mailto:atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es)



**Horario:**  
- PRESENCIA o TELEFONICAL:  
Lunes a  
Viernes: 8.30 – 14.30h



Nota: La aguja está en el interior del protector de seguridad verde.



CONSULTA de ATENCIÓN  
FARMACEUTICA  
SERVICIO DE FARMACIA  
HOSPITAL DE LA LINEA  
AGSCG ESTE



956969276



[atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es](mailto:atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es)



**Horario:** Lunes a Viernes:  
de 8.00 – 18.00h

### ¿Qué hacer si olvida una dosis?

En caso de olvido, adminístresela inmediatamente, respetando el intervalo posológico de 28 días para la siguiente dosis. Nunca duplique la dosis para compensar el olvido.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: reacción en el punto de inyección (enrojecimiento, picor, hinchazón, etc), vértigo o estreñimiento.

### Observaciones:

12. No administrar en caso de alergia a Erenumab o a algún componente de este medicamento. Si tiene una infección activa o alguna enfermedad cardiovascular, consúltelo con su médico.
13. Informe a su médico y farmacéutico si:
14. Se ha vacunado recientemente.
15. Esta embarazada, está dando el pecho o lo tiene previsto.
16. En caso de sobredosis.
17. Tiene signos de reacción alérgica grave (taquicardia, dificultad para respirar, hinchazón de labios, alteración súbita de la tensión, etc), avise INMEDIATAMENTE.
18. Si está tomando otros medicamentos

### Excipientes de declaración obligatoria

Sacarosa, polisorbato 80.  
Exento de sodio (menos de 1 mmol Sodio / 120 mg)

### Identificación

AIMOVIG® se presenta en una pluma precargada que contiene 70 mg de Erenumab. Es una solución inyectable de transparente a opalescente, de incolora a amarillo claro y prácticamente libre de partículas.

## Advertencias

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.