



Etanercept



Enbrel® 25 – 50 mg jeringa precargada

¿Qué es y para que se utiliza?

Etanercept es un agente biológico que actúa reduciendo el dolor y la inflamación asociados a ciertas enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica o psoriasis.

¿Cómo conservar?

Conservar en **NEVERA** (entre 2 y 8°C). **No congelar.**



Si por accidente la medicación quedara fuera de la nevera o se congelara, no la deseche y consulte a su servicio de farmacia.

¿Cómo se administra?

La pauta habitual es de 1 o 2 administraciones a la semana según valoración médica.

Se administra vía subcutánea de la siguiente manera:

1. Saque la jeringa de la nevera 30 minutos para que se atempere. No retire la cubierta ni agite.
2. Lávese las manos con agua y jabón.
3. Seleccione la zona de inyección (muslo o abdomen al menos a 5 cm del ombligo), evite zonas con dolor, amoratadas o endurecidas.
4. Desinfecte la zona con algodón y alcohol 70°.
5. Retire la cubierta de la aguja.
6. Pellizque la piel con el dedo pulgar e índice e introduzca suavemente la aguja en la piel en un ángulo entre 45° y 90°.
7. Empuje con el pulgar el embolo de la jeringa hasta administrar toda la medicación.
8. Retire la jeringa de su piel.
9. Levante el pulgar del embolo para activar el protector de la aguja. El protector cubrirá la aguja y es posible que escuche un "clic".
10. Tire la jeringa a un contenedor rígido sin colocar la cubierta.



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA.

SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL DE LA LINEA
AGSCG ESTE



956969276



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



Horario: Lunes a Viernes
de 8.00 – 18.00h

¿Qué hacer si olvida una dosis?

Si olvida administrarse una dosis, deberá inyectársela tan pronto como lo recuerde, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada. Nunca se administre una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Riesgo aumentado de infecciones, efectos adversos en el punto de inyección (inflamación, dolor, enrojecimiento, picor), o reacción alérgica. Avise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Observaciones:

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Etanercept. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

No se inyecte en un lugar en el que la piel esté enrojecida, tenga un moratón o esté dura. Si presenta una infección activa (como la gripe o una úlcera en una pierna) no debe comenzar tratamiento con Etanercept. Algunas vacunas están contraindicadas durante el tratamiento. Consulte con su médico antes de ser vacunado.

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Etanercept no debe utilizarse durante el embarazo, si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Las mujeres no deben dar el pecho durante el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Sacarosa, cloruro de sodio, fosfato de sodio monopotásico monohidratado, fosfato sódico dibásico anhidro.

Presentación

Jeringa de vidrio (tipo I) transparente, provista de una aguja de acero inoxidable con un capuchón de goma y de un émbolo de plástico. Cada envase contiene 4 jeringas precargadas de Enbrel con 4 toallitas de algodón con alcohol. El capuchón de la aguja contiene goma seca natural (látex, **no lo manipule si presenta alergia al látex**).

La solución es transparente y de incolora a color amarillo pálido o marrón pálido.

Advertencias

- **Conservar en nevera (2-8°C). NO CONGELAR.**
Si por accidente la medicación quedara fuera de la nevera o se congelara, no la deseche y consulte al farmacéutico.
- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Las plumas administradas no las deseche en la basura doméstica. Térelas en un contenedor rígido para objetos punzantes y llévelas a cualquier punto SIGRE.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**

- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

