

# Everolimus 10, 5 o 2.5 mg

30 comprimidos

## ¿Qué es y para que se utiliza?

Utilizado en el tratamiento de distintos tipos de cáncer, como: el de mama, riñón, y tumores neuroendocrinos de páncreas gastrointestinales y/o pulmón.

## ¿Cómo conservar?

Everolimus debe conservarse a temperatura inferior a 25°C en su embalaje original protegido de la humedad.

## ¿Cómo se administra?

Tomar **con o sin comida**.

Tragar comprimidos enteros (no triturar ni partir) con un vaso de agua.

Se recomienda tomar siempre a la misma hora.

Si vomita después de tomar dabrafenib, no repita la toma y espere a la siguiente dosis.

## ¿Qué hacer si olvida una dosis?

En caso de olvido, tómela inmediatamente, salvo si han transcurrido más de 18 horas desde la última toma. Nunca duplique la dosis para compensar el olvido.

## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Infecciones, disminución del apetito, alteraciones del gusto, heridas en la boca, dolor de cabeza, sangrado nasal, tos, diarrea, náuseas, reacciones dérmicas, cansancio y retención de líquido.

Insomnio, dolor óseo/muscular, aumento de tensión arterial, vómitos, sequedad de piel y mucosas (inflamación de mucosas), dolor bucal, fragilidad/perdida capilar, dolor abdominal, problemas al tragar, menstruación irregular y fiebre.

## Observaciones:

Everolimus puede interactuar con otros medicamentos pudiendo perder eficacia o provocar la aparición de efectos adversos.

Comuníquese a su médico o farmacéutico otros medicamentos o suplementos dietético o producto natural que esté tomando.

No tomar hierba de San Juan (Hypericum) o zumo de pomelo.

## Excipientes de declaración obligatoria

LACTOSA



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA  
SERVICIO DE FARMACIA HOSPITAL SAS LA LINEA



697958259



[atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es](mailto:atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es)



Horario:

- PRESENCIAL:  
Lunes a Viernes:  
8.30 – 18:00 H

## Advertencias

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

## Recomendaciones especiales

### Manipulación Medicamentos especiales:



- Lávese las manos antes y después de manipular la medicación.
- Extraiga los comprimidos o capsulas del envase en el momento de la administración. No conserve en pastilleros o dispositivos similares fuera de su envase.
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua sin masticar, triturar ni chupar.
- En caso que requiera triturar o fraccionar, hagalo dentro de una bolsa hermética, con guantes y mascarilla



### ¿Qué hago si?

- **Piel seca, picor:** Utilice cremas hidratantes, jabón suave, no utilice agua caliente ni se esponga al sol.
- **Ojos secos:** Utilice lágrimas artificiales o suero fisiológico para mantener la hidratación
- **Cansancio o sueño alterado:** Haga ejercicio suave, evite bebidas estimulantes (cafeína, te, etc).
- **Pelo frágil:** Evite tintes, permanentes y calor excesivo en lavado y secado.
- **Nauseas, diarrea:** Siga una dieta ligera repartida en 5 tomas diarias. Tome agua abundante en pequeños sorbos. En caso de sabor metálico, utilice utensilios de plástico o tome caramelos de sabor fuerte (menta o chocolate). Evite el alcohol o cafeína.
- **Aftas bucales:** utilice cepillos suaves y colutorios acuosos-viscosos tras cada comida.