



## Evolocumab

Repatha® 140 mg, pluma precargada de un solo uso.

### ¿Qué es y para que se utiliza?

Anticuerpo monoclonal hipolipemiante indicado en hipercolesterolemia y/o dislipemia refractarias a otros tratamientos de elección y de alto riesgo cardiovascular.



### ¿Cómo conservar?

Repatha® debe conservarse en nevera entre 2-8°C. No congelar

### ¿Cómo se administra?

La pauta habitual es una inyección subcutánea de 140 mg cada 2 semanas, siguiendo los siguientes pasos:

1. Saque la pluma de la nevera 15 minutos para que se atempere. No agitar.
2. Lávese las manos con agua y jabón.
3. Seleccione la zona de inyección (muslo, abdomen o en la parte externa de la parte superior de los brazos), evite zonas con dolor, amoratadas o endurecidas.
4. Desinfecte la usando algodón con alcohol 70°.
5. Retire el capuchón naranja de la pluma sin tocar el protector amarillo.
6. Pellizque la zona de piel limpia con firmeza.
7. Coloque el protector amarillo de la pluma en ángulo recto respecto a la piel pellizcada de forma que pueda ver la ventana y presione con firmeza la pluma contra el cuerpo hasta que el protector amarillo de seguridad ya no quede a la vista.
8. Con su dedo índice o pulgar presione el botón pulsador gris, oirá un "click" y sentirá un pinchazo.
9. Mantenga presionando contra la piel 15 segundos para asegurar la inyección completa. Oirá un "click" La ventana de inspección debe haber pasado a color amarillo.
10. Saque la pluma del lugar de inyección en línea recta.
11. Puede que vea una gota de sangre en el lugar de inyección. Limpie con un algodón suavemente, pero sin frotar.



**CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA**  
SERVICIO DE FARMACIA  
HOSPITAL DE LA LINEA  
AGSCG ESTE



956969276



[atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es](mailto:atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es)



Horario: Lunes a Viernes:  
de 8.00 – 18.00h

### ¿Qué hacer si olvida una dosis?

En caso de olvido, adminístrese la inyección inmediatamente, respetando el intervalo posológico de 14 días para la siguiente dosis. Nunca duplique la dosis para compensar el olvido.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: síndrome pseudogripal (goteo nasal, dolor de garganta, dolor de articulaciones, etc), molestias en el punto de inyección y náuseas. Si percibe cualquier otro efecto que le preocupe, consulte con su médico o farmacéutico.

### Observaciones:

- No hay interacciones conocidas de otros medicamentos con Repatha®.
- No se recomienda el tratamiento con Repatha® en caso de embarazo ni durante la lactancia materna al no existir estudios que garanticen la seguridad del feto o lactante, limitándose sólo a situaciones clínicas que lo justifiquen.

### Excipientes de declaración obligatoria

Ninguno

### Identificación

REPATHA® se presenta en una pluma precargada SureClick que contiene 140 mg de evolocumab en 1 ml de solución. Es una solución entre transparente y opalescente, entre incolora y amarillenta y prácticamente libre de partículas.

## Advertencias

---

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

