



Fremanezumab

Ajovy® 225 mg, jeringa precargada de un solo uso.

¿Qué es y para que se utiliza?

Anticuerpo monoclonal indicado en migraña crónica o episódica de alta frecuencia refractaria a otros tratamientos de elección.

¿Cómo conservar?

Conservar en **NEVERA** (entre 2 y 8°C). No congelar.

Si por accidente la medicación quedara fuera de la nevera o se congelara, no la deseche y consulte a su servicio de farmacia.

¿Cómo se administra?


Existen 2 pautas posológicas que será valorada por el médico prescriptor:

- 1 administración mensual de 225 mg (1 jeringa).
- 1 administración trimestral de 675 mg (3 jeringas)

Se administra vía subcutánea de la siguiente manera:



1. Saque la pluma de la nevera 30 minutos para que se atempere. No retire el capuchón ni agite.
2. Lávese las manos con agua y jabón.
3. Seleccione la zona de inyección (muslo o abdomen al menos a 5 cm del ombligo), evite zonas con dolor, amoratadas o endurecidas.
4. Desinfecte la piel con algodón y alcohol 70°.
5. Compruebe que la jeringa no esté dañada, el líquido es transparente e incoloro y la fecha de caducidad es correcta antes de administrarlo.
6. Retire el capuchón de la jeringa.
7. Pellizque suavemente al menos 2,5 cm de la piel que ha limpiado.
8. Introduzca la aguja en la piel pellizcada en un ángulo de 45-90°.
9. Presione lentamente el émbolo completamente hasta inyectar todo el contenido de la jeringa.
10. Extraiga la aguja de la piel y deseche la jeringa (sin capuchón) en un contenedor rígido para que no haya riesgo de pincharse.
11. Presione suavemente el lugar de inyección durante unos segundos sin frotar.



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA
SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL DE LA LINEA
AGSCG ESTE



956969276



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



Horario: Lunes a Viernes:
de 8.00 – 18.00h



¿Qué hacer si olvida una dosis?

En caso de olvido, adminístrela inmediatamente, respetando el intervalo posológico de mensual o trimestral para la siguiente dosis. Nunca duplique la dosis para compensar el olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: reacción en el punto de inyección (enrojecimiento, picor, hinchazón, etc), vértigo o estreñimiento.

Observaciones:

No administrar en caso de alergia a Fremanezumab o a algún componente de este medicamento. Si tiene una infección activa o alguna enfermedad cardiovascular, consúltelo con su médico.

Informe a su médico y farmacéutico si:

- Se ha vacunado recientemente.
- Está embarazada, está dando el pecho o lo tiene previsto.
- En caso de sobredosis.
- Tiene signos de reacción alérgica grave (taquicardia, dificultad para respirar, hinchazón de labios, alteración súbita de la tensión, etc), avise INMEDIATAMENTE.
- Si está tomando otros medicamentos

Excipientes de declaración obligatoria

Sacarosa

Edetato disódico dihidratado

Identificación

AJOVY® se presenta en una jeringa precargada que contiene 225 mg de Galcanezumab en 1,5 ml de solución en una jeringa de vidrio de tipo I de 2,25 ml con tapón del émbolo (caucho de bromobutilo) y aguja.

Advertencias

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.