



Galcaezumab

Emgality® 120 mg, pluma precargada de un solo uso.

¿Qué es y para que se utiliza?

Anticuerpo monoclonal indicado en migraña crónica refractaria a otros tratamientos de elección.

¿Cómo conservar?


Emgality® debe conservarse en nevera entre 2-8°C. No congelar

¿Cómo se administra?

La dosis de inicio es de 240 mg (2 plumas) y la dosis de mantenimiento de 120 mg (1 pluma) cada 4 semanas.

Se administra vía subcutánea de la siguiente manera:

1. Saque la pluma de la nevera 15 minutos para que se atempere. No retirar la tapa ni agitar.
2. Lávese las manos con agua y jabón.
3. Seleccione la zona de inyección (muslo o abdomen al menos a 5 cm del ombligo), evite zonas con dolor, amoratadas o endurecidas.
4. Desinfecte la piel con algodón y alcohol 70°.
5. Desenrosque y retire la tapa blanca de la base.
6. Coloque la base plana y transparente firmemente sobre la piel. Gire el anillo de bloqueo hacia la posición de desbloqueo.
7. Presione y mantenga pulsado el botón de inyección verde, escuchara un click alto. Mantenga la pluma de forma fija sobre la piel hasta escuchar un segundo click a los 5-10 segundos que indica que su inyección ha terminado. Retire la pluma de su piel.
8. Tire la pluma a un contenedor de objetos punzantes sin poner la tapa a la base.
9. Puede que vea una gota de sangre en el lugar de inyección. Limpie con un algodón suavemente, pero sin frotar.



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA
SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL SAS LA LINEA




956969276
697958259



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



Horario:
- PRESENCIA o TELEFONICAL:
Lunes a
Viernes: 8.30 – 14.30h





CONSULTA de ATENCIÓN
FARMACEUTICA
SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL DE LA LINEA
AGSCG ESTE



956969276



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



Horario: Lunes a Viernes:
de 8.00 – 18.00h

¿Qué hacer si olvida una dosis?

En caso de olvido, adminístresela inmediatamente, respetando el intervalo posológico de 28 días para la siguiente dosis. Nunca duplique la dosis para compensar el olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: reacción en el punto de inyección (enrojecimiento, picor, hinchazón, etc), vértigo o estreñimiento.

Observaciones:

10. No administrar en caso de alergia a Galcanezumab o a algún componente de este medicamento. Si tiene una infección activa o alguna enfermedad cardiovascular, consúltelo con su médico.
11. Informe a su médico y farmacéutico si:
12. Se ha vacunado recientemente.
13. Esta embarazada, está dando el pecho o lo tiene previsto.
14. En caso de sobredosis.
15. Tiene signos de reacción alérgica grave (taquicardia, dificultad para respirar, hinchazón de labios, alteración súbita de la tensión, etc), avise INMEDIATAMENTE.
16. Si está tomando otros medicamentos

Excipientes de declaración obligatoria

Histidina, polisorbato 80.
Exento de sodio (menos de 1 mmol Sodio / 120 mg)

Identificación

EMGALITY® se presenta en una pluma precargada que contiene 120 mg de Galcanezumab en 1 ml de solución. Es una solución inyectable en una jeringa de vidrio transparente. Su color puede variar de incoloro a ligeramente amarillo.

Advertencias

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.