



# GOLIMUMAB

Simponi® 50 y 100 mg. Pluma precargada

## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Golimumab es un agente biológico indicado en el tratamiento de artritis reumatoide (moderada/severa), artritis psoriásica, espondilitis anquilosante o colitis ulcerosa en pacientes adultos.

## ¿Cómo conservar?


Conservar en **NEVERA** (entre 2 y 8°C). No congelar.

Si por accidente la medicación quedara fuera de la nevera o se congelara, no la deseche y consulte a su servicio de farmacia.

## ¿Cómo se administra?

Golimumab se administra vía subcutánea (bajo la piel). La dosis prescrita se administra mensualmente.

1. Saque la pluma precargada fuera de nevera 15-30 minutos a temperatura ambiente antes de la administración.
2. Lávese las manos cuidadosamente, desinfecta la piel de la zona de inyección usando una gasa impregnada en alcohol 70°. Las zonas de inyección están señaladas en la imagen. Para cada administración debe cambiar el sitio de inyección.
3. Gire la tapa para romper el precinto de seguridad, deséchela y no vuelva a ponerla. Inyecte en el plazo de cinco minutos tras retirar la tapa.
4. Presione el extremo abierto firmemente contra la piel en ángulo de 90°. Pulse el botón con los dedos, como se indica en la figura.
5. Escuchará un fuerte "clic". Mantenga el autoinyector sobre el punto de inyección hasta que escuche un segundo "clic". Pueden transcurrir 5-15 segundos hasta que escuche el segundo "clic". Retire el autoinyector en la misma dirección (90°). Compruebe el indicador amarillo en la ventana de visualización.
6. Deseche la pluma en un contenedor de desecho para objetos punzantes. Cualquier resto de medicación debe ser desechado.



### CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA.

SERVICIO DE FARMACIA  
HOSPITAL DE LA LINEA  
AGSCG ESTE



697958259  
956969276



[atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es](mailto:atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es)



Horario: Lunes a Viernes  
de 8.00 – 18.00h

### ¿Qué hacer si olvida una dosis?

Si olvida administrarse una dosis, deberá inyectársela tan pronto como lo recuerde.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Consulte a su médico o solicite atención médica de inmediato si tiene algún síntoma de infección grave, por ejemplo, fiebre, síntomas pseudogripales, sudores nocturnos, sensación de cansancio o dificultad para respirar, tos persistente, calor, enrojecimiento y dolor en la piel o una erupción cutánea dolorosa con ampollas.

Avise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

### Observaciones:

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Golimumab. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Tras un aprendizaje adecuado, la inyección se la podrá administrar usted mismo u otra persona (por ejemplo, familiar o amigo). No intente inyectarse hasta que esté seguro de cómo hacerlo.

No se inyecte en un lugar en el que la piel esté enrojecida, tenga un moratón o esté dura.

Si presenta una infección activa (como gripe o una úlcera en una pierna) no debe comenzar tratamiento con Golimumab.

Algunas vacunas están contraindicadas durante el tratamiento. Consulte con su médico antes de ser vacunado.

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y al menos 21 semanas después de su finalización. Golimumab no debe utilizarse durante el embarazo, si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. La lactancia materna no debe realizarse durante el tratamiento.

### Excipientes de declaración obligatoria

Sorbitol.

## Advertencias

- **Conservar en nevera (2-8°C). NO CONGELAR**
- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Las plumas o jeringas administradas no las deseche en la basura doméstica. Ténelo en un contenedor rígido para objetos punzantes y llévelas a cualquier punto SIGRE.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.