



Guselkumab

Tremfya® 100 mg. jeringa precargada

¿Qué es y para que se utiliza?

Guselkumab es un agente biológico indicado en el tratamiento de la psoriasis en placas de moderada a grave en adultos.

¿Cómo conservar?


Conservar en **NEVERA** (entre 2 y 8°C). No congelar. Si por accidente la medicación quedara fuera de la nevera o se congelara, no la deseche y consulte al farmacéutico.

¿Cómo se administra?

Guselkumab se administra vía subcutánea (bajo la piel). La dosis inicial suele ser una administración 100 mg (1 pluma) en la semana 0 y 4 y continuar con una dosis de mantenimiento cada 8 semanas.

Se administra vía subcutánea de la siguiente manera:

1. Saque la jeringa de la nevera 30 minutos para que se atempere. No retire la cubierta ni agite.
2. Lávese las manos con agua y jabón.
3. Seleccione la zona de inyección (muslo o abdomen al menos a 5 cm del ombligo), evite zonas con dolor, amoratadas o endurecidas.
4. Desinfecte la zona con algodón y alcohol 70°.
5. Retire la cubierta de la aguja.
6. Pellizque la piel con el dedo pulgar e índice e introduzca suavemente la aguja en la piel en un ángulo entre 45° y 90°.
7. Empuje con el pulgar el émbolo verde de la jeringa hasta administrar toda la medicación.
8. Retire la jeringa de su piel.
9. Levante el pulgar del émbolo para activar el protector de la aguja. El protector cubrirá la aguja y es posible que escuche un "clic".
10. Tire la jeringa a un contenedor rígido sin colocar la cubierta.



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA.
SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL DE LA LINEA
AGSCG ESTE






956969276



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



Horario: Lunes a Viernes de 8.00 – 18.00h



¿Qué hacer si olvida una dosis?

Si olvida administrarse una dosis, deberá comunicárselo a su médico o farmacéutico para conocer cuando debe administrarse la siguiente dosis. Nunca se administre una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Riesgo aumentado de infecciones en vías respiratorias altas, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, diarreas, efectos adversos en el punto de inyección (inflamación, dolor, enrojecimiento, picor) o reacción alérgica

Avise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Observaciones:

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de guselkumab. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Si presenta una infección activa (como gripe), debe suspender temporalmente el tratamiento e informar a su médico o farmacéutico. Algunas vacunas están contraindicadas durante el tratamiento. Consulte con su médico antes de ser vacunado.

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y 12 semanas después de finalizar el tratamiento. Si quedara embarazada informe a su médico. Del mismo modo, no se recomienda la lactancia materna durante el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Ninguno

Advertencias

- **Conservar en nevera (2-8°C). NO CONGELAR**
- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Las plumas administradas no las deseche en la basura doméstica. Télelo en un contenedor rígido para objetos punzantes y llévelas a cualquier punto SIGRE.



- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.