



Ixekizumab



Taltz® 80 mg. Pluma precargada

¿Qué es y para que se utiliza?

Ixekizumab es un agente biológico indicado en el tratamiento de la psoriasis en placas, artritis psoriásica o espondiloartritis axial.

¿Cómo conservar?

Conservar en **NEVERA** (entre 2 y 8°C). No congelar.

¿Cómo se administra?

En psoriasis en placa, la dosis de inicio recomendada es de 160 mg (2 plumas) en semana 0, seguida de 80 mg (1 pluma) en semana 2, 4, 6, 8, 10, y 12 y continuar con una dosis de mantenimiento de 80 mg (1 pluma) cada 4 semanas.

En artritis psoriásica o espondiloartritis, la dosis de inicio recomendada es de 160 mg (2 plumas) seguida de una dosis de mantenimiento de 80 mg (1 pluma) cada 4 semanas.

Se administra vía subcutánea de la siguiente manera:

1. Saque la pluma de la nevera 15 minutos para que se atempere. No retirar la tapa ni agitar.
2. Lávese las manos con agua y jabón.
3. Seleccione la zona de inyección (muslo o abdomen al menos a 5 cm del ombligo), evite zonas con dolor, amoratadas o endurecidas.
4. Desinfecte la piel con algodón y alcohol 70°.
5. Desenrosque y retire la tapa blanca de la base.
6. Coloque la base plana y transparente firmemente sobre la piel. Gire el anillo de bloqueo hacia la posición de desbloqueo.
7. Presione y mantenga pulsado el botón de inyección verde, escuchara un click alto. Mantenga la pluma de forma fija sobre la piel hasta escuchar un segundo click a los 5-10 segundos que indica que su inyección ha terminado. Retire la pluma de su piel.
8. Tire la pluma a un contenedor de objetos punzantes sin poner la tapa a la base.
9. Puede que vea una gota de sangre en el lugar de inyección. Limpie con un algodón suavemente, pero sin frotar.



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA
SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL DE LA LINEA
AGSCG ESTE




956969276



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



Horario: Lunes a Viernes
de 8.00 – 18.00h



¿Qué hacer si olvida una dosis?

Si olvida una dosis, deberá administrársela tan pronto como lo recuerde, reajustando la fecha de la siguiente dosis según la pauta prescrita. Nunca se administre una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos secundarios más frecuentes son: infección de vías respiratorias y tiña, cefalea, mareos, náuseas, vómitos, dolor muscular, dolor articular, cefalea, dolor de garganta o reacción en el punto de inyección (picor, erupción, enrojecimiento)

Avisé a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Observaciones:

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Ixekizumab. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Si presenta una infección activa (como gripe), debe suspender temporalmente el tratamiento e informar a su médico o farmacéutico. Algunas vacunas están contraindicadas durante el tratamiento. Consulte con su médico antes de ser vacunado.

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y al menos 10 semanas tras su finalización. Si quedara embarazada, informe a su médico. Del mismo modo, no se recomienda la lactancia materna durante el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por 80 mg de dosis, por lo que se considera esencialmente "libre de sodio".

Advertencias

- **Conservar en nevera (2-8°C). NO CONGELAR.**
Si por accidente la medicación quedara fuera de la nevera o se congelara, no la deseche y consulte al farmacéutico.
- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Las plumas administradas no las deseche en la basura doméstica. Térelas en un contenedor rígido para objetos punzantes y llévelas a cualquier punto SIGRE.



- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico