



Lenalidomida 21 cápsulas

25,20,15,10 ,5 mg cápsulas

¿Qué es y para que se utiliza?

Fármaco utilizado en algunos tipos de neoplasias hematológicas.

¿Cómo conservar?

Conservar las cápsulas en su embalaje original protegido de la luz y a una temperatura no superior a 25°C.

¿Cómo se administra?

Lenalidomida debe tomarse vía oral, con o sin alimento. Tome siempre a la misma hora, preferiblemente por la mañana. Trague las cápsulas enteras, sin triturar, masticar ni partir.

La dosis se hará acorde al tipo de neoplasia hematológica, y podrá ser ajustada según tolerancia del paciente. Los ciclos serán de 21 días de tratamiento y 7 días de descanso.

¿Qué hacer si olvida una dosis?

No tome la dosis olvidada y continúe su tratamiento con normalidad. En caso de vómito, no tome una nueva dosis ese día y continúe su tratamiento con normalidad.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: alteraciones gastrointestinales (diarrea, vomito, dolor abdominal), infecciones, dolor de cabeza, dolor muscular, picor, erupción cutánea, hipo o hipertensión, visión borrosa o lagrimeo, aumento o disminución de peso.

En caso de padecer cualquier síntoma que le preocupe, consulte con su médico o farmacéutico



CONSULTA DE
ATENCIÓN
FARMACEUTICA.
SERVICIO DE FARMACIOA
HOSPITAL DE LA LINEA
AGSCG ESTE



956969276



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



Horario: Lunes a Viernes
de 8.30 – 18:00h

Observaciones:

Lenalidomida puede interactuar con otros medicamentos pudiendo perder eficacia o provocar la aparición de efectos adversos. Comunique a su médico otros medicamentos o suplementos dietético o producto natural que esté tomando.

Este medicamento es teratogénico y puede afectar al feto. Por tanto deberá tomar medidas anticonceptivas. No puede donar sangre ni semen durante el tratamiento hasta 4 semanas después de finalizar.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa y Propilenglicol.

Advertencias

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

Recomendaciones

Manipulación Medicamentos especiales:

- Lávese las manos antes y después de manipular la medicación.
- Extraiga los comprimidos o capsulas del envase en el momento de la administración. No conserve en pastilleros o dispositivos similares fuera de su envase.
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua sin masticar, triturar ni chupar.
- En caso que requiera triturar o fraccionar, hagalo dentro de una bolsa hermética, con guantes y mascarilla

¿Qué hago si?

- **Piel seca, picor:** Utilice cremas hidratantes, jabón suave, no utilice agua caliente ni se exponga al sol.
- **Ojos secos:** Utilice lágrimas artificiales o suero fisiológico para mantener la hidratación
- **Cansancio o sueño alterado:** Haga ejercicio suave, evite bebidas estimulantes (cafeína, te, etc).
- **Pelo frágil:** Evite tintes, permanentes y calor excesivo en lavado y secado.
- **Nauseas, diarrea:** Siga una dieta ligera repartida en 5 tomas diarias. Tome agua abundante en pequeños sorbos. En caso de sabor metálico, utilice utensilios de plástico o tome caramelos de sabor fuerte (menta o chocolate). Evite el alcohol o cafeína.
- **Aftas bucales:** utilice cepillos suaves y colutorios acuosos-viscosos tras cada comida.