



Macitentan

Macitentan EFG® 10 mg, 30 comprimidos.

¿Qué es y para que se utiliza?

Fármaco indicado para el tratamiento de:

- Hipertensión arterial pulmonar que es una enfermedad en la que se produce un estrechamiento importante de los vasos sanguíneos de los pulmones, aumentando la presión de las arterias pulmonares y dificultando la oxigenación y la actividad física.

¿Cómo conservar?

Conservar en su embalaje original protegido de la luz y a una temperatura no superior a 25°C.

¿Cómo se administra?

La dosis recomendada de Macitentan es de 10 mg una vez al día que puede tomar con o sin alimento. Intente tomar sobre la misma hora y trague el comprimido entero (sin fraccionar ni masticar) con un poco de agua.

¿Qué hacer si olvida una dosis?

En caso de olvido, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada. Nunca tome dosis doble para compensar el olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: anemia, alteración de la función hepática que puede generar náuseas, vómitos, fiebre, molestia digestiva, ictericia, orina de color oscuro, picor o dolor muscular.

Macitentan puede producir también hipotensión, mareos y visión borrosa. Por lo que, si percibe dichos síntomas, no conduzca ni maneje maquinaria.

Si percibe cualquier otro efecto que le preocupe, consulte con su médico o farmacéutico.



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA
SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL DE LA LINEA
AGSCG ESTE




956969276



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



Horario: Lunes a Viernes:
de 8.00 – 18.00h



Observaciones:

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Macitentán. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Macitentán no se debe tomar juntamente con:

- Rifampicina (tratamiento para la tuberculosis)
- Carbamazepina y fenitoína (tratamiento para la epilepsia)
- Hierba de San Juan

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada, informe a su médico. Del mismo modo, no se recomienda la lactancia materna durante el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa
Lecitina de soja.

Identificación

Opsumit® se presenta como comprimidos recubiertos, redondos, blancos y con "10" grabado a ambos lados.



Advertencias

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

