



Glecaprevir / Pibrentasvir

Maviret® 100/40 mg, comprimidos recubiertos

¿Qué es y para que se utiliza?

Maviret® es un antiviral indicado para el tratamiento de hepatitis C.

¿Cómo conservar?

Maviret® debe conservarse a temperatura inferior a 25°C en su embalaje original protegido de la humedad.

¿Cómo se administra?

Debe tomar **tres comprimidos juntos al día, con alimentos**. Debe tragarlo entero con un vaso de agua, sin masticar, triturar ni partir.

¿Qué hacer si olvida una dosis?

En caso de olvido, tómelo inmediatamente, salvo que falte menos de 18 horas para la siguiente toma. Nunca duplique la dosis para compensar el olvido.

Si vomita en las 3 primeras horas tras el tratamiento, tómese otra dosis, pero si ya han pasado 3 horas, no es necesario repetir la dosis.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: diarrea, dolor de cabeza y debilidad.

Informe a su médico en caso de reacción alérgica (picor, hinchazón, dificultad al respirar), orina oscura, pérdida de apetito, vómitos, piel u ojos amarillos o si percibe cualquier otro efecto que le preocupe.

Observaciones:

Maviret® puede interactuar con otros medicamentos: medicamentos para el colesterol (atorvastatina, simvastatina, etc), anticonceptivos con etinilestradiol, antivirales para el VIH (atazanavir, darunavir, efavirenz, lopinavir, ritonavir) y otros (carbamazepina, rifampicina, ciclosporina, digoxina, dabigatrán, hierba de San Juan).

Comunique a su médico/farmacéutico todos los medicamentos que está tomando para el estudio de posibles interacciones.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe a su médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA
SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL SAS LA LINEA
AGSCG ESTE



956969276



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



Horario: Lunes a Viernes:
de 8.00 – 18.00h

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa.

Identificación

Maviret® se presenta en comprimido recubierto con película de color rosa, ovalado, biconvexo, de 18,8 mm × 10,0 mm, marcado con "NXT" en una cara.



Advertencias

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

Recomendaciones especiales

- El éxito de su tratamiento dependerá del correcto cumplimiento. No deje de tomar su medicación sin consultar con su médico o farmacéutico.
- Mantenga siempre las medidas de prevención de contagio del virus hacia otras personas.

