



Melfalan

Alkeran® 2 mg comprimidos

¿Qué es y para que se utiliza?

Fármaco utilizado en algunos tipos de neoplasias hematológicas y adenocarcinoma de ovario.

¿Cómo conservar?

Conservar las cápsulas en su embalaje original protegido de la luz y



refrigerado.

¿Cómo se administra?

Melfalan debe tomarse vía oral sin alimento, 1 hora antes o dos horas después de comer. Tome siempre a la misma hora, preferiblemente por la mañana. Trague los comprimidos enteros, sin triturar, masticar ni partir.

La dosis total calculada por kg de peso del paciente se tomará durante 4 días seguidos, y podrá ser ajustada según tolerancia del paciente.

¿Qué hacer si olvida una dosis?

No tome la dosis olvidada y continúe su tratamiento con normalidad. En caso de vómito, no tome una nueva dosis ese día y continúe su tratamiento con normalidad.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: alteraciones gastrointestinales (náuseas y vómitos), infecciones, dolor muscular, picor, erupción cutánea, caída leve del cabello y aumento riesgo de hemorragias.

En caso de padecer cualquier síntoma que le preocupe, consulte con su médico o farmacéutico



CONSULTA DE
ATENCIÓN
FARMACEUTICA.
SERVICIO DE FARMACIOA
HOSPITAL DE LA LINEA
AGSCG ESTE



956969276



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



Horario: Lunes a Viernes
de 8.30 – 18:00h

Observaciones:

Melfalan puede interactuar con otros medicamentos pudiendo perder eficacia o provocar la aparición de efectos adversos. Comunique a su médico otros medicamentos o suplementos dietético o p
esté tomando.



Excipientes de declaración obligatoria

No procede.

Advertencias

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

Recomendaciones

Manipulación Medicamentos especiales:



- Lávese las manos antes y después de manipular la medicación.
- Extraiga los comprimidos o capsulas del envase en el momento de la administración. No conserve en pastilleros o dispositivos similares fuera de su envase.
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua sin masticar, triturar ni chupar.
- En caso que requiera triturar o fraccionar, hagalo dentro de una bolsa hermética, con guantes y mascarilla

¿Qué hago si?



- **Piel seca, picor:** Utilice cremas hidratantes, jabón suave, no utilice agua caliente ni se exponga al sol.
- **Ojos secos:** Utilice lágrimas artificiales o suero fisiológico para mantener la hidratación
- **Cansancio o sueño alterado:** Haga ejercicio suave, evite bebidas estimulantes (cafeína, te, etc).
- **Pelo frágil:** Evite tintes, permanentes y calor excesivo en lavado y secado.
- **Nauseas, diarrea:** Siga una dieta ligera repartida en 5 tomas diarias. Tome agua abundante en pequeños sorbos. En caso de sabor metálico, utilice utensilios de plástico o tome caramelos de sabor fuerte (menta o chocolate). Evite el alcohol o cafeína.
- **Aftas bucales:** utilice cepillos suaves y colutorios acuosos-viscosos tras cada comida.