



Obeticólico



Ocaliva® 5 mg y 10 mg, 30 comprimidos.

¿Qué es y para que se utiliza?

Fármaco indicado para el tratamiento de *Colangitis Biliar Primaria* en combinación con ácido ursodesoxicólico o en monoterapia en caso de intolerancia de ácido ursodesoxicólico.

¿Cómo conservar?

Conservar en su embalaje original protegido de la luz y a una temperatura no superior a 25°C.

¿Cómo se administra?

Ácido obeticólico debe tomarse vía oral, con o sin alimento, dos veces al día. Trague el comprimido entero (sin partir ni triturar) con un poco de agua.

Debe tener en cuenta que, si está en tratamiento con resinas secuestradoras de ácidos biliares, debe tomar el **ácido obeticólico** al menos de 4 a 6 horas antes o 4 a 6 horas después de haber tomado dicha resina.

¿Qué hacer si olvida una dosis?

En caso de olvido, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada. Nunca tome dosis doble para compensar el olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: dolor de estómago, cansancio, prurito y erupción en la piel.

Si percibe cualquier otro efecto que le preocupe, consulte con su médico o farmacéutico.



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA
SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL DE LA LINEA
AGSCG ESTE




956969276



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



Horario: Lunes a Viernes:
de 8.00 – 18.00h



Observaciones:

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de **ácido obeticoólico**. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada, informe a su médico. Del mismo modo, no se recomienda la lactancia materna durante el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Carboximetilalmidón sódico

Identificación

Comprimido recubierto con película:

- Ocaliva 5 mg comprimidos recubiertos con película

Comprimido redondo de 8 mm, amarillo, con las letras «INT» grabadas en una cara y el número «5» en la otra.



- Ocaliva 10 mg comprimidos recubiertos con película

Comprimido triangular de 8 mm x 7 mm, amarillo, con las letras «INT» grabadas en una cara y el número «10» en la otra.



Advertencias

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

