

PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN VIH

Emtricitabina 200 mg / Tenofovir 245 mg, comprimidos

Raltegravir 400 mg, comprimidos

¿Qué es y para que se utiliza?

La profilaxis postexposición (Post-EXP) consiste en la administración de fármacos antirretrovirales (Emtricitabina 200 mg/ Tenofovir 245 mg + Raltegravir 400 mg) tras una exposición accidental de riesgo elevado al virus VIH.

¿Cuándo iniciar?

Se recomienda iniciar el tratamiento lo antes posible, preferiblemente en las primeras horas tras la exposición accidental y como máximo 72 horas después.



¿Cuánto dura el tratamiento?

28 días.

¿Cómo conservar?

Conservar a temperatura inferior a 25°C en su embalaje original protegido de la humedad.

¿Cómo se administra?

	<u>Desayuno</u> 	<u>Cena</u> 	<u>¿cómo administrarlo?</u>
Emtricitabina 200 mg / Tenofovir 245 mg	1 comp		Con alimentos
Raltegravir 400 mg	1 comp	1 comp	

¿Qué debo saber sobre esta terapia?

Durante el periodo de seguimiento clínico, especialmente durante las primeras 6-12 semanas tras la exposición, es fundamental que tome medidas para prevenir la transmisión del VIH y otras infecciones, que incluyen, no donar sangre, semen, órganos, no compartir agujas ni jeringuillas, abstenerse o tomar medidas para prevenir la transmisión durante las relaciones sexuales (utilizando siempre preservativo) y evitar el embarazo y lactancia.



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA
SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL SAS LA LINEA
AGSCG ESTE



956969276



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



Horario: Lunes a Viernes:
de 8.00 – 18.00h

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Todos los fármacos antirretrovirales pueden producir toxicidad a corto plazo, aunque en general no suele ser grave. Los principales efectos secundarios que pueden aparecer durante la profilaxis post exposición incluyen:

- **Tenofovir/Emtricitabina EFG®:** Náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, erupción cutánea, manchas en la piel, dolor abdominal, cansancio, en ocasiones aumento del colesterol y triglicéridos y raramente alteraciones renales.
- **Raltegravir (ISENTRESS®):** Mareo (evitar conducir si se produce), somnolencia, dolor de cabeza, flatulencia (gases), náuseas, vómitos, diarrea, picor, erupción en la piel, dolor en articulaciones, sudores nocturnos o pérdida de apetito

Precauciones:

Informe a su médico en caso de:

- Alergia a los principios activos o excipientes de la Post-EXP.
- Diagnóstico positivo para VIH.
- Embarazo o lactancia.
- Enfermedad hepática, renal u ósea.
- Otros medicamentos incluidos en su terapia habitual para estudio de interacciones medicamentosas (antiinflamatorios, antibióticos, antivirales, inmunosupresores, etc)

Advertencias

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

Recomendaciones especiales

- El éxito de su tratamiento dependerá del correcto cumplimiento. No deje de tomar su medicación sin consultar con su médico o farmacéutico.
- Mantenga siempre las medidas de prevención de contagio del virus hacia otras personas.