



PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN VIH

Emtricitabina 200 mg / Tenofovir 245 mg, comprimidos

¿Qué es y para que se utiliza?

La profilaxis preexposición (PrEP) consiste en la administración de fármacos antirretrovirales (Emtricitabina 200 mg/ Tenofovir 245 mg) para la prevención de la transmisión del VIH a personas seronegativas con alto riesgo de infección.

¿Cómo conservar?

Conservar a temperatura inferior a 25°C en su embalaje original protegido de la humedad.

¿Cómo se administra?

Un comprimido al día, preferiblemente con alimentos. Tragar entero con un vaso de agua, sin masticar, triturar ni partir. En caso de olvido, tómelo inmediatamente, salvo que falte menos de 12 horas para la siguiente toma. Nunca duplique la dosis para compensar el olvido. En caso de vómitos, sólo si ha transcurrido menos de 1 hora tras tomar Emtricitabina/Tenofovir, deberá tomar otro comprimido.

¿Qué debo saber sobre esta terapia?

- La eficacia dependerá del buen cumplimiento terapéutico. Tome la medicación todos los días, no sólo cuando considere que haya estado en riesgo de contraer la infección.
- La PrEP no tiene una eficacia del 100%, pero un buen cumplimiento junto a otras medidas de prevención ofrece un nivel muy alto de protección.
- La PrEP no protege de otras infecciones de transmisión sexual (sífilis, gonorrea, clamidia, herpes genital, etc)
- En consultas médicas periódicas se realizará el seguimiento de tolerancia, adherencia y eficacia de la PrEP.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Son escasos los efectos adversos de la PrEP aunque pueden aparecer molestias digestivas al inicio de la terapia. Además, puede provocar alteraciones de la función renal o alteraciones óseas de baja intensidad y reversibles tras la suspensión del tratamiento.

Si aparecen síntomas de hipersensibilidad o cualquier otro síntoma que le preocupe, comuníquese a su médico o farmacéutico.



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA
SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL SAS LA LINEA
AGSCG ESTE



956969276



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



Horario: Lunes a Viernes:
de 8.00 – 18.00h

Precauciones:

Informe a su médico en caso de:

- Alergia a los principios activos o excipientes de la PrEP.
- Diagnóstico positivo para VIH.
- Embarazo o lactancia.
- Enfermedad hepática, renal u ósea.
- Otros medicamentos incluidos en su terapia habitual para estudio de interacciones medicamentosas (antiinflamatorios, antibióticos, antivirales, inmunosupresores, etc)

Advertencias

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

Recomendaciones especiales

- El éxito de su tratamiento dependerá del correcto cumplimiento. No deje de tomar su medicación sin consultar con su médico o farmacéutico.
- Mantenga siempre las medidas de prevención de contagio del virus hacia otras personas.

