


MUCOSITIS

Todas las medidas que debe seguir para aliviar las molestias bucales producidas por su tratamiento



SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL SAS LA LÍNEA
AGS Campo de Gibraltar ESTE

Teléfono:
697958259

Mail:
atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



©Copyright Fundación GEDEFO

D.L.:B-9102-2009

Nombre del paciente



¿POR QUÉ ES NECESARIA SU COLABORACIÓN?

- El tratamiento que usted recibe puede causar mucositis, que es una inflamación del tubo digestivo.
- En la parte interna de la boca puede producir llagas, úlceras, dolor y sangrado.
- Estas molestias desaparecen al finalizar el tratamiento.



¿QUÉ MEDIDAS GENERALES DEBE TOMAR?

- Siga una rigurosa higiene dental.
- Visite a su dentista, ya que las caries y las prótesis dentales favorecen la aparición de estas lesiones.
- Mantenga los labios hidratados.



CONSEJOS:

- Utilice un cepillo dental blando para la limpieza de los dientes.
- Cepílese los dientes después de las comidas.
- Enjuáguese la boca con el colutorio que le recomiende su médico.
- Evite tomar bebidas o alimentos muy calientes, picantes o ácidos.



PRECAUCIONES:

- Si siente dolor intenso o dificultad para tomar bebidas o alimentos llame a su médico en horas de consulta.
- Consulte con su médico o farmacéutico en el hospital si usted o sus familiares desean más información.

