



## DARUNAVIR / COBICISTAT

Rezolsta® 800 / 150 mg, comprimidos recubiertos

### ¿Qué es y para que se utiliza?

Combinación de 2 fármacos antirretrovirales: un inhibidor de la proteasa con un potenciador (Darunavir/cobicistat) indicados para el tratamiento de la infección por el VIH

### ¿Cómo conservar?

Rezolsta® debe conservarse a temperatura inferior a 25°C en su embalaje original protegido de la humedad.

### ¿Cómo se administra?

Debe tomar un comprimido al día, con alimentos. Debe tragarlo entero con un vaso de agua, sin masticar, triturar ni partir.

### ¿Qué hacer si olvida una dosis?

En caso de olvido, tómelo inmediatamente, salvo que falte menos de 6 horas para la siguiente toma. Nunca duplique la dosis para compensar el olvido.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: trastorno del sueño, dolor de cabeza, mareos, náuseas, diarrea, flatulencia, dispepsia, pérdida de apetito o erupción en la piel.

Si percibe cualquier otro efecto que le preocupe, consulte con su médico o farmacéutico.



**CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA**  
SERVICIO DE FARMACIA  
HOSPITAL DE LA LINEA  
AGSCG ESTE



956969276



[atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es](mailto:atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es)



Horario: Lunes a Viernes:  
de 8.00 – 18.00h

## Observaciones:

Rezolsta® puede interactuar con otros medicamentos, suplementos dietéticos o productos naturales, por lo que no tome ningún otro medicamento sin consultarlo con su médico o farmacéutico.

Rezolsta® interacciona con zumo de pomelo, hierba de san Juan, rifampicina, carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, digoxina, amiodarona, ticagrelor, anticoagulantes orales, estatinas o anticonceptivos orales.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe a su médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.

## Excipientes de declaración obligatoria

Ninguno

## Identificación

Rezolsta® se presenta en un frasco que contiene 30 comprimidos con forma de cápsula, entre amarillo y amarillo pardo, de 22 mm x 11 mm, con la inscripción «8121» en una cara y «JG» en la otra.

## **Advertencias**

---

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

## **Recomendaciones especiales**

---

- El éxito de su tratamiento dependerá del correcto cumplimiento. No deje de tomar su medicación sin consultar con su médico o farmacéutico.
- Mantenga siempre las medidas de prevención de contagio del virus hacia otras personas.