



## Ribociclib

Kisqali® 200 mg. Comprimidos

### ¿Qué es y para que se utiliza?

Fármaco antineoplásico, que impide la proliferación celular, utilizado en el cáncer de mama.

### ¿Cómo conservar?

Conservar las cápsulas en su embalaje original protegido de la luz y a una temperatura no superior a 25°C.

### ¿Cómo se administra?

Ribociclib debe tomarse vía oral, con o sin alimento. Tome siempre a la misma hora, preferiblemente por la mañana. Trague los comprimidos enteros, sin triturar, masticar ni partir.

La dosis inicial es 600 mg (3 comprimidos) una vez al día, pero puede ser ajustada según tolerancia del paciente. Los ciclos serán de 21 días de tratamiento y 7 días de descanso.

### ¿Qué hacer si olvida una dosis?

No tome la dosis olvidada y continúe su tratamiento con normalidad. En caso de vómito, no tome una nueva dosis ese día y continúe su tratamiento con normalidad.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: alteraciones gastrointestinales (diarrea, vomito, dolor abdominal), infecciones, cansancio, disminución de apetito, dolor de cabeza, dolor muscular, pérdida de cabello, picor, erupción cutánea, retención de líquido, dificultad respiratorio o tos.

En caso de padecer cualquier síntoma que le preocupe, consulte con su médico o farmacéutico



**CONSULTA DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA.**  
SERVICIO DE FARMACIA  
HOSPITAL DE LA LINEA  
AGSCG ESTE



956969276



[atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es](mailto:atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es)



Horario: Lunes a Viernes  
de 8.30 – 18:00h

## Observaciones:

Ribociclib puede interactuar con otros medicamentos pudiendo perder eficacia o provocar la aparición de efectos adversos. Comunique a su médico otros medicamentos o suplementos dietético o producto natural que esté tomando.

Informe a su médico si padece de alguna enfermedad cardíaca o pulmonar antes de iniciar el tratamiento.

Ribociclib debe ir acompañado de otro medicamento, puede ser letrozol, anastrozol o fulvestrant. Además, en mujeres pre o perimenopáusicas, se debe combinar con la administración subcutánea de agonista de la hormona liberadora de hormona luteinizante.

## Excipientes de declaración obligatoria

Lecitina de soja.

## Advertencias

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

## Recomendaciones especiales

### Manipulación Medicamentos especiales:

- Lávese las manos antes y después de manipular la medicación.
- Extraiga los comprimidos o capsulas del envase en el momento de la administración. No conserve en pastilleros o dispositivos similares fuera de su envase.
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua sin masticar, triturar ni chupar.
- En caso que requiera triturar o fraccionar, hagalo dentro de una bolsa hermética, con guantes y mascarilla



### ¿Qué hago si?

- **Piel seca, picor:** Utilice cremas hidratantes, jabón suave, no utilice agua caliente ni se exponga al sol.
- **Ojos secos:** Utilice lágrimas artificiales o suero fisiológico para mantener la hidratación
- **Cansancio o sueño alterado:** Haga ejercicio suave, evite bebidas estimulantes (cafeína, te, etc).
- **Pelo frágil:** Evite tintes, permanentes y calor excesivo en lavado y secado.
- **Nauseas, diarrea:** Siga una dieta ligera repartida en 5 tomas diarias. Tome agua abundante en pequeños sorbos. En caso de sabor metálico, utilice utensilios de plástico o tome caramelos de sabor fuerte (menta o chocolate). Evite el alcohol o cafeína.
- **Aftas bucales:** utilice cepillos suaves y colutorios acuosos-viscosos tras cada comida.