



# Risankizumab

Skyrizi® 150 mg. Jeringa precargada

## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Risankizumab es un agente biológico indicado para el tratamiento de la psoriasis en placa de moderada a grave.

## ¿Cómo conservar?

Conservar en **NEVERA** (entre 2 y 8°C). No congelar. Si por accidente la medicación quedara fuera de la nevera o se congelara, no la deseche y consulte a su servicio de farmacia.

## ¿Cómo se administra?

Risankizumab se administra vía subcutánea (bajo la piel). La dosis inicial es de 150 mg (una inyección) la semana 0 y 4, posteriormente, mantenimiento cada 12 semanas.

Lávese las manos meticulosamente antes de cada inyección, limpie el sitio de inyección con la toallita impregnada en alcohol que se suministra con el medicamento y elija el lugar de cada administración, un lugar diferente para cada jeringa a administrar (como parte delantera del muslo izquierdo, parte delantera del muslo derecho o abdomen, este último sitio al menos a 5 cm del ombligo). Tras la inyección, presione con un algodón o gasa el sitio de inyección durante unos segundos. NO frote.

Se recomienda sacar de la nevera las jeringas que vaya a inyectarse al menos 15 minutos antes, evitando exponerla a la luz solar directa. Dicha jeringa **NUNCA** debe reutilizarse.

## ¿Qué hacer si olvida una dosis?

Si olvida administrarse una dosis, deberá inyectársela tan pronto como lo recuerde.

## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Consulte a su médico o solicite atención médica de inmediato si tiene algún síntoma de infección grave, por ejemplo, fiebre, síntomas pseudogripales, sudores nocturnos, sensación de cansancio o dificultad para respirar, tos persistente, calor, enrojecimiento y dolor en la piel o una erupción cutánea dolorosa con ampollas.

Avisé a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.



### CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA.

SERVICIO DE FARMACIA  
HOSPITAL DE LA LINEA  
AGSCG ESTE



956969276



[atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es](mailto:atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es)



Horario: Lunes a Viernes  
de 8.00 – 18.00h

### **Observaciones:**

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Risankizumab. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Tras un aprendizaje adecuado, la inyección se la podrá administrar usted mismo u otra persona (por ejemplo, familiar o amigo). No intente inyectarse hasta que esté seguro de cómo hacerlo.

No se inyecte en un lugar en el que la piel esté enrojecida, tenga un moratón o esté dura.

Si presenta una infección activa (como gripe o una úlcera en una pierna) no debe comenzar tratamiento con Risankizumab.

Algunas vacunas están contraindicadas durante el tratamiento. Consulte con su médico antes de ser vacunado.

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y al menos 21 semanas después de su finalización. Risankizumab no debe utilizarse durante el embarazo, si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. La lactancia materna no debe realizarse durante el tratamiento.

### **Excipientes de declaración obligatoria**

Sorbitol.

## **Advertencias**

- **Conservar en nevera (2-8°C). NO CONGELAR**



- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Las plumas o jeringas administradas no las deseche en la basura doméstica. Ténelo en un contenedor rígido para objetos punzantes y llévelas a cualquier punto SIGRE.



- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.