



# Siponimod

Mayzent® 0,25 mg, 2 mg. comprimidos

## ¿Qué es y para que se utiliza?

Fármaco indicado para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Siponimod es un agente inmunomodulador que ajusta el sistema inmunitario para limitar los daños al Sistema Nervioso Central.

## ¿Cómo conservar?

Conservar las cápsulas en su embalaje original protegido de la luz y a una temperatura no superior a 25°C.

## ¿Cómo se administra?

Siponimod debe tomarse vía oral, con o sin alimento, una vez al día, preferentemente por la mañana. No debe fraccionar ni masticar, el comprimido debe tomarlo entero con un poco de agua.

Pauta de ajuste de la dosis para llegar a la dosis de mantenimiento:

		Dosis	Nº comprimidos
<b>INDUCCIÓN</b>	Día 1	0,25 mg	1 de 0,25 mg
	Día 2	0,25 mg	1 de 0,25 mg
	Día 3	0,50 mg	2 de 0,25 mg
	Día 4	0,75 mg	3 de 0,25 mg
	Día 5	1,25 mg	5 de 0,25 mg
<b>MANTENIMIENTO</b>	a partir del día 6	2 mg	1 de 2 mg

El médico podrá valorar un ajuste de dosis en caso de detectar en sus revisiones médicas una metabolización lenta de siponimod (genotipo CYP2C9\*3)

## ¿Qué hacer si olvida una dosis?

En caso de olvido, tome la dosis tan pronto como sea posible, excepto si ha transcurrido más de 12 horas de la dosis olvidada. Nunca duplique una dosis para compensar una dosis olvidada.



**CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA**  
SERVICIO DE FARMACIA  
HOSPITAL DE LA LINEA  
AGSCG ESTE



697958259  
956969276



[atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es](mailto:atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es)



Horario: Lunes a Viernes  
de 8.00-18.00h

## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: dolor de cabeza, infecciones, hipertensión, manchas en la piel, diarrea, temblor o elevación de enzimas hepáticas. Otros efectos menos frecuentes son arritmias, edema macular y alteraciones respiratorias.

En caso de padecer cualquier síntoma que le preocupe, consulte con su médico o farmacéutico. Siponimod está contraindicado de:

- Hipersensibilidad
- Síndrome de inmunodeficiencia
- Episodio previo de Leucoencefalopatía multifocal progresiva o meningitis criptocócica.
- Neoplasias activas
- Insuficiencia hepática grave
- Enfermedad cardiovascular
- Embarazo
- Polimorfismo CYP2C9\*3\*3 (metabolizador pobre)

## Observaciones:

Siponimod puede interactuar con otros medicamentos pudiendo perder eficacia o provocar la aparición de efectos adversos. Comunique a su médico otros medicamentos o suplementos dietético o producto natural que esté tomando.

Debido al alto riesgo de infecciones, se recomienda evitar vacunas atenuadas durante el tratamiento y dos meses tras su finalización.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz. En caso de quedar embarazada, informe a su médico. Se desconoce si siponimod se excreta en leche materna, por lo que no se recomienda administrar el tratamiento durante la lactancia.

## Excipientes de declaración obligatoria

Ninguno

## Identificación

Gilenya® 0,5 mg se presenta en forma de cápsulas duras amarillas y blancas con dos líneas amarillas y la impresión "FTY 0,5 mg".



## Advertencias

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.

- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.

