



Teriflunomida



Aubagio® 14 mg. 28 comprimidos

¿Qué es y para que se utiliza?

Fármaco indicado para el tratamiento de la esclerosis múltiple remitente recurrente.

¿Cómo conservar?

Conservar las cápsulas en su embalaje original protegido de la luz y a una temperatura no superior a 25°C.

¿Cómo se administra?

Teriflunomida debe tomarse vía oral, con o sin alimento, habitualmente una vez al día. Tragar el comprimido entero con un poco de agua.

¿Qué hacer si olvida una dosis?

En caso de olvido, tome la dosis tan pronto como sea posible, excepto si falta menos de 12 horas para la siguiente dosis.

Nunca tome doble dosis para compensar el olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: pérdida de cabello, acné, dolor muscular y articular, visión borrosa, ansiedad o pérdida de peso. De forma menos frecuente puede padecer dificultad respiratoria, alteraciones cardíacas, confusión o dolor de cabeza.

En caso de padecer cualquier síntoma que le preocupe, consulte con su médico o farmacéutico.



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA
SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL DE LA LINEA
AGSCG ESTE




956969276



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



Horario: Lunes a Viernes de 8.00-18.00h



Observaciones:

Teriflunomida puede interactuar con otros medicamentos pudiendo perder eficacia o provocar la aparición de efectos adversos. Comunique a su médico otros medicamentos o suplementos dietético o producto natural que esté tomando.

Dado que teriflunomida puede producir alteraciones visuales y mareos, no se recomienda conducir vehículos ni manejar máquinas pesadas.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz. En caso de quedar embarazada, informe a su médico. Se desconoce si teriflunomida se excreta en leche materna, por lo que no se recomienda administrar el tratamiento durante la lactancia.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa

Identificación

Aubagio® 14 mg se presenta en forma de comprimido recubierto azul claro recubierto con impresión de "14" en una cara y el logo comercial al otro.



Advertencias

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.

