



# Tocilizumab

Roactemra® 162 mg. Jeringa precargada

## ¿Qué es y para que se utiliza?

Tocilizumab es un agente biológico indicado en el tratamiento de la artritis reumatoide o artritis idiopática juvenil, en pacientes no respondedores a otros tratamientos para la artritis.

## ¿Cómo conservar?

Conservar en **NEVERA** (entre 2 y 8°C). No congelar.

## ¿Cómo se administra?

La pauta recomendada es una dosis de 162 mg semanal.

Se administra vía subcutánea de la siguiente manera:

1. Saque la jeringa de la nevera 30 minutos para que se atempere. No retire la cubierta ni agite.
2. Lávese las manos con agua y jabón.
3. Seleccione la zona de inyección (muslo o abdomen al menos a 5 cm del ombligo), evite zonas con dolor, amoratadas o endurecidas.
4. Desinfecte la zona con algodón y alcohol 70°.
5. Retire la cubierta de la aguja.
6. Pellizque la piel con el dedo pulgar e índice e introduzca suavemente la aguja en la piel en un ángulo entre 45° y 90°.
7. Empuje con el pulgar el émbolo verde de la jeringa hasta administrar toda la medicación.
8. Retire la jeringa de su piel.
9. Levante el pulgar del émbolo para activar el protector de la aguja. El protector cubrirá la aguja y es posible que escuche un "clic".
10. Tire la jeringa a un contenedor rígido sin colocar la cubierta.





**CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEÚTICA.**  
SERVICIO DE FARMACIA  
HOSPITAL DE LA LINEA  
AGSCG ESTE



956969276

[atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es](mailto:atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es)

Horario: Lunes a Viernes de 8.00 – 18.00h



### ¿Qué hacer si olvida una dosis?

Si olvida administrarse la inyección de Tocilizumab y está dentro del plazo de tres días de la fecha prevista, administrar la dosis omitida inmediatamente y permanezca en la pauta semanal original

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos secundarios más frecuentes son: infección de vías respiratorias altas, reacciones en el punto de inyección (picor, erupción, enrojecimiento), dolor abdominal, ulceración oral, gastritis, cefalea, mareo, tos o erupción cutánea. Avise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

### Observaciones:

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Tocilizumab. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Si presenta una infección activa (como gripe), debe suspender temporalmente el tratamiento e informar a su médico o farmacéutico. Algunas vacunas están contraindicadas durante el tratamiento. Consulte con su médico antes de ser vacunado.

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada, informe a su médico. Del mismo modo, no se recomienda la lactancia materna durante el tratamiento.

### Excipientes de declaración obligatoria

Ninguno

### Presentación

Jeringa precargada de vidrio tipo I con cubierta de aguja rígido (junta de elastómero con una carcasa de polipropileno) y embolo de goma de butilo con un revestimiento de fluororesina. Cada jeringa contiene 162 mg de Tocilizumab en 0,9 ml de solución incolora a amarillo pálido.

## Advertencias

- **Conservar en nevera (2-8°C). NO CONGELAR.**  
Si por accidente la medicación quedara fuera de la nevera o se congelara, no la deseche y consulte al farmacéutico.
- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Las plumas administradas no las deseche en la basura doméstica. Térelo en un contenedor rígido para objetos punzantes y llévelas a cualquier punto SIGRE.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico