



# Vinorelbina



Navelbine® 20, 30 mg cápsulas

## ¿Qué es y para que se utiliza?

Fármaco citostático utilizado en el tratamiento de distintas neoplasias.

## ¿Cómo conservar?

Conservar en nevera (entre 2-8°C) y mantener en su embalaje original cerrado protegido de la humedad.

## ¿Cómo se administra?

Tomar con **alimento**, preferentemente con el desayuno. Nunca con zumo de pomelo.

Antes de tomar el fármaco asegúrese que la cápsula no esté dañada. Si hay contacto con el líquido que contiene lavar la zona minuciosamente con agua o suero fisiológico. No masticar, ni chupar ni disolver la capsula. Si por error ocurriera esto enjuáguese la boca con agua y suero fisiológico y comuníquelo a su médico.

Si vomita al cabo de pocas horas de la toma, no debe repetir nunca la administración de la dosis.

## ¿Qué hacer si olvida una dosis?

Si ha olvidado una toma, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próximo de la siguiente toma. Nunca duplique la dosis para compensar el olvido.

## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: anemia, neutropenia o plaquetopenia, pérdida de reflejos, náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento; falta de apetito, caída del cabello, cansancio o fiebre.

## Observaciones:

Vinorelbina puede interactuar con otros medicamentos pudiendo perder eficacia o provocar la aparición de efectos adversos. Comuníquese a su médico otros medicamentos o suplementos dietético o producto natural que esté tomando.

Mujeres en edad fértil debe utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. No debe realizar este tratamiento en caso de embarazo o lactancia.



**CONSULTA DE  
ATENCIÓN  
FARMACEUTICA**  
SERVICIO DE FARMACIA  
HOSPITAL DE LA LINEA  
AGSCG ESTE



956969276



[atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es](mailto:atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es)



Horario:

- PRESENCIAL:  
Lunes a Viernes:  
8.30 – 18:00h

## Excipientes de declaración obligatoria

Etanol, sorbitol, propilenglicol, glicerol.

## Advertencias

- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

## Recomendaciones especiales

### Manipulación Medicamentos especiales:

- Lávese las manos antes y después de manipular la medicación.
- Extraiga los comprimidos o capsulas del envase en el momento de la administración. No conserve en pastilleros o dispositivos similares fuera de su envase.
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua sin masticar, triturar ni chupar.
- En caso que requiera triturar o fraccionar, hagalo dentro de una bolsa hermética, con guantes y mascarilla



### ¿Qué hago si?

- **Piel seca, picor:** Utilice cremas hidratantes, jabón suave, no utilice agua caliente ni se exponga al sol.
- **Ojos secos:** Utilice lágrimas artificiales o suero fisiológico para mantener la hidratación
- **Cansancio o sueño alterado:** Haga ejercicio suave, evite bebidas estimulantes (cafeína, te, etc).
- **Pelo frágil:** Evite tintes, permanentes y calor excesivo en lavado y secado.
- **Nauseas, diarrea:** Siga una dieta ligera repartida en 5 tomas diarias. Tome agua abundante en pequeños sorbos. En caso de sabor metálico, utilice utensilios de plástico o tome caramelos de sabor fuerte (menta o chocolate). Evite el alcohol o cafeína.
- **Aftas bucales:** utilice cepillos suaves y colutorios acuosos-viscosos tras cada comida.