



# Infliximab



Remsima® 120 mg. Pluma precargada

## ¿Qué es y para que se utiliza?

Infliximab es un agente biológico que actúa reduciendo el dolor y la inflamación asociados a ciertas enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica o psoriasis.

## ¿Cómo conservar?


Conservar en **NEVERA** (entre 2 y 8°C). **No congelar.**

Si por accidente la medicación quedara fuera de la nevera o se congelara, no la deseche y consulte a su servicio de farmacia.

## ¿Cómo se administra?

La pauta habitual es de 1 administración cada 2 semanas tras superar la fase de inducción. Se administra vía subcutánea de la siguiente manera:

1. Saque la pluma de la nevera 30 minutos para que se atempere. No retire el tapón ni agite.
2. Lávese las manos con agua y jabón.
3. Seleccione la zona de inyección (muslo, abdomen al menos a 5 cm del ombligo o parte posterior del brazo), evite zonas con dolor, amoratadas o endurecidas.
4. Limpie la piel con algodón y alcohol 70°.
5. Compruebe que la pluma no esté dañada, el líquido es transparente e incoloro y la fecha de caducidad antes de administrarlo.
6. Retire el tapón verde de la pluma sin girarlo y no vuelva a ponerlo porque podría bloquear la pluma.
7. Sin pellizcar ni estirar la piel coloque la pluma firmemente sobre la piel a 90°.
8. Presione la pluma sobre la piel hasta hundir la cubierta de la aguja morada. Escuchará un "clic" cuando comience la administración y podrá ver el embolo verde oliva por el visor de la pluma. Sostenga la pluma hasta escuchar un segundo "clic" y cuente 5 segundos para garantizar una administración completa.
9. Retire la pluma de su piel. Verá que se extenderá el protector para cubrir la aguja y se bloqueará.
10. Tire la pluma a un contenedor de objetos punzantes.
11. Puede que vea una gota de sangre en el lugar de inyección. Limpie con un algodón suavemente, pero sin frotar.



**CONSULTA de ATENCIÓN FARMACÉUTICA.**  
SERVICIO DE FARMACIA  
HOSPITAL DE LA LINEA  
AGSCG ESTE



956969276



[atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es](mailto:atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es)



Horario: Lunes a Viernes  
de 8.00 – 18.00h

### ¿Qué hacer si olvida una dosis?

Si olvida administrarse una dosis, deberá inyectársela tan pronto como lo recuerde, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada. Nunca se administre una dosis doble para compensar un olvido.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Riesgo aumentado de infecciones, efectos adversos en el punto de inyección (inflamación, dolor, enrojecimiento, picor), o reacción alérgica. Avise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de síntomas de una reacción alérgica, problemas de corazón, signos de infección o posibles signos de cáncer.

### Observaciones:

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Infliximab. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

No se inyecte en un lugar en el que la piel esté enrojecida, tenga un moratón o esté dura. Si presenta una infección activa (como la gripe o una úlcera en una pierna) no debe comenzar tratamiento con Infliximab. Algunas vacunas están contraindicadas durante el tratamiento. Consulte con su médico antes de ser vacunado.

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Infliximab no debe utilizarse durante el embarazo, si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Las mujeres no deben dar el pecho durante el tratamiento.

### Excipientes de declaración obligatoria

Sorbitol.

### Presentación

1 ml de solución inyectable estéril, transparente e incoloro en pluma precargada de un solo uso. La jeringa dentro de la pluma está fabricada con vidrio de tipo 1 con un tapón del émbolo (de elastómero revestido de flurotec), aguja fina calibre 29 y protector de aguja rígido.

Sin látex que pueda causar alergia. Sin citrato que pueda causar dolor.

## Advertencias

- **Conservar en nevera (2-8°C). NO CONGELAR.** Si por accidente la medicación quedara fuera de la nevera o se congelara, no la deseche y consulte al farmacéutico.
- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Las plumas administradas no las deseche en la basura doméstica. Térelas en un contenedor rígido para objetos punzantes y llévelas a cualquier punto SIGRE.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico