



GONORREA

La gonorrea es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria llamada *Neisseria Gonorrhoeae* (o gonococo).



SITUACIÓN DE LA INFECCIÓN EN ANDALUCÍA

CASOS EN ANDALUCÍA AÑO 2018/2022



Datos obtenidos de Red Alerta Años 2018- 2022
Descenso en la declaración debido a la pandemia Covid 19

Más del 50% de las mujeres y el 10% de los hombres no presenta síntomas.

FACTOR DE RIESGO

HOMBRES QUE TIENEN RELACIONES CON HOMBRES

MÚLTIPLES PAREJAS

LA INFECCIÓN ES COMÚN EN LOS JÓVENES

EDAD MEDIA

27 - 30 AÑOS

¿CÓMO SE MANIFIESTA?

Afecta a zona genital, región faríngea y rectal.



¿CÓMO SE CONTRAE?

- ✓ Sexo sin preservativo vía oral, vaginal o anal, con una persona que tiene la infección.
- ✓ Transmisión vertical en el canal del parto.
- ✓ En ocasiones puede ser asintomática, pero puede transmitir.

¿CÓMO SE PREVIENE?

TENER SEXO CON PROTECCIÓN.

Uso correcto del preservativo sea sexo oral, vaginal o anal.

Notificar la infección a sus **contactos sexuales.**

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

Mediante una muestra de exudado de la zona genital, faríngea o anal.

Muestra de orina.

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO

SI TENGO GONORREA

- 👤 Su contacto también puede tenerlo.
- ✅ Comunicar a todos sus contactos sexuales para que se hagan una prueba y reciban tratamiento si lo necesitan.
- ❌ No mantener relaciones sexuales hasta terminar el tratamiento.

¿QUIÉNES SON MIS CONTACTOS ESTRECHOS?

Desde **14 días** previos al inicio de síntomas.

Período de incubación **2/7 días.**

CONTROL/CURACIÓN

VISITA DE CONTROL
a las 3 semanas del tratamiento.

- ✓ Sin tratamiento la infección extenderse a otras regiones del organismo piel y articulaciones.
- ✓ En el caso de la mujer puede desarrollar enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad y embarazo ectópico.
- ✓ Aunque se haya tenido tratado la infección, se puede volver a reinfectar.

CEFTRIAXONA

500MG INTRAMUSCULAR

Cefixima

NO ES EL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN SOLO EN CASO DE NO DISPONER DEL ANTERIOR USAR CEFIXIMA ORAL

GONORREA MULTIRRESISTENTE

La resistencia a los antimicrobianos en el gonococo ha aumentado en los últimos años y ha reducido las opciones terapéuticas.

El uso inadecuado de los antibióticos aumenta la resistencias a estos.

“**PROTEGERSE ES PROTEGER**”

EL USO DEL PRESERVATIVO EN LAS RELACIONES SEXUALES SEAN ANALES, ORALES Y VAGINALES PREVIENE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

FUENTES:

PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE INFECCIÓN GONOCÓCICA
<http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/>
RED DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
Consejería de Salud y Consumo

Redacción y diseño: AGS Campo de Gibraltar Este y Oeste
UGC Salud Pública, Epidemiología y Vigilancia de la Salud