

PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN

HOSPITAL DE DÍA

Hospital SAS La Línea

Servicio de Farmacia

Área de Mezclas Intravenosas

956 969273

ALPROSTADILO

Presentación: 20 mcg / 1 ml

Vía administración: PERFUSIÓN INTRAVENOSA (VÍA PERIFÉRICA)

Precauciones especiales: El envase original no conservar a temperatura superior a 20°C.

La solución reconstituida/diluida es de 24 horas entre 2-8°C.

Consideraciones previas:

- Uso en arteriopatía periférica.
- No requiere precauciones especiales de protección del personal sanitario ni precisa recomendaciones especiales en la preparación y administración del fármaco.

Premedicación:

- No precisa.

Preparación y Ritmo de perfusión de la mezcla:

- Disolver el contenido de 3 vial de Alprostadil (equivalentes a 60 microgramos de alprostadil) en 250 ml de solución salina fisiológica 0,9% e infundir la solución resultante por vía intravenosa durante un periodo de 3 horas
- **No administrar ALPROSTADILO como inyección en bolo, ni vía subcutánea ni intramuscular.**

Precauciones/Contraindicaciones:

- Precauciones generales:

Alprostadil debe ser administrado únicamente por prescripción facultativa, bajo estricto control médico especializado, en centros con un equipamiento adecuado que permita la monitorización cardiovascular del paciente.

- Administración con precauciones:

Los pacientes que reciben alprostadil deben ser estrechamente monitorizados durante cada dosis. Se deben realizar controles frecuentes de la función cardiovascular, incluyendo la monitorización de la presión arterial, la frecuencia cardiaca, y el balance hidrolítico. Antes de dar el alta a un paciente debe tener instaurada una condición cardiovascular estable.