

PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN

HOSPITAL DE DÍA

Hospital SAS La Línea

Servicio de Farmacia

Área de Mezclas Intravenosas

956 969273

ANIFROLUMAB

Presentación: 300 mg / 2 ml

Vía administración: PERFUSIÓN INTRAVENOSA (VÍA PERIFÉRICA)

Precauciones especiales: Conservar en nevera (2-8°C)

Consideraciones previas:

- Anifrolumab está indicado como tratamiento de lupus eritematoso sistémico (LES) con autoanticuerpos positivos, activo de moderado a grave en pacientes adultos, en combinación con el tratamiento estándar y mantiene un seguimiento por el Servicio de Reumatología.
- La dosis recomendada es de 300 mg administrados mediante perfusión intravenosa cada 28 días.

Premedicación:

- En pacientes con antecedentes de reacciones relacionadas con la perfusión, se puede administrar premedicación (p. ej., un antihistamínico) antes de la perfusión de anifrolumab.

Preparación y Ritmo de perfusión de la mezcla (Preparado en Farmacia):

- Inspeccionar el contenido claro y transparente del vial. Desechar en caso de turbidez y no agitar.
- Diluir 300 mg (2 ml) de Saphnelo® (Anifrolumab) en **100 ml de solución de cloruro de sodio al 0,9 %**.
- Invierta la solución para perfusión de ANIFROLUMAB suavemente para que se mezcle por completo. No la agite.
- **Perfundir durante aproximadamente 30 minutos con un filtro en línea estéril de 0,2 a 15 micras de baja unión a proteínas.**
- Puede ralentizarse la velocidad de perfusión o interrumpirse la perfusión si el paciente presenta una reacción a la perfusión.
- El profesional sanitario responsable debe observar o controlar al paciente durante y después de la perfusión, de conformidad con la práctica clínica habitual.
- **No administrar ANIFROLUMAB como inyección en bolo ni administrar conjuntamente con otros medicamentos a través de la misma vía de perfusión.**

Precauciones/Contraindicaciones:

- Contiene Polisorbato 80 e Histidina.
- El tratamiento con anifrolumab no debe iniciarse en pacientes con cualquier infección activa clínicamente significativa hasta que la infección se haya resuelto o esté tratada adecuadamente.
- No está recomendado durante el embarazo, en mujeres en edad fértil ni durante la lactancia.
- No administrar en caso de hipersensibilidad al fármaco.