

# PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN

## HOSPITAL DE DÍA

### Hospital SAS La Línea

Servicio de Farmacia

Área de Mezclas Intravenosas

956 969272

### CAPLACIZUMAB

Presentación: 10 mg polvo y disolvente para solución inyectable

Vía administración: Subcutánea

Precauciones especiales: Conservar en nevera (2-8°C)

#### Consideraciones previas:

La dosis recomendada es de 10 mg vía parenteral cada 24 horas. La primera dosis será administrada vía intravenosa y continuará vía subcutánea **en el abdomen** como dosis de mantenimiento. Se deben evitar las inyecciones en el área alrededor del ombligo y las inyecciones consecutivas no se deben administrar en el mismo cuadrante abdominal.

#### Premedicación:

- No precisa

#### Preparación y Ritmo de perfusión de la mezcla:


Paso 1 - Desinfección del tapón de goma

Paso 2 - Colocación del adaptador

- Coja el adaptador del vial envasado y retire la cubierta de papel. Deje el adaptador en el envase de plástico abierto.


No toque el adaptador.

- Coloque el adaptador sobre el vial, mientras mantiene el adaptador en su envase de plástico.
- Presione firmemente hacia abajo hasta que el adaptador encaje en su lugar, con la punta del adaptador atravesando el tapón del vial. Deje el adaptador conectado al vial, todavía en su envase exterior.



Paso 3 - Preparación de la jeringa


- Sosteniendo la jeringa en su mano, rompa la tapa blanca con la otra mano.
- No use la jeringa si la tapa blanca falta, está suelta o está dañada.




- No toque la punta de la jeringa ni deje que toque ninguna superficie.
- Coloque la jeringa sobre la superficie limpia y plana.

#### Paso 4 – Conexión de la jeringa con el adaptador y el vial

- Tome el vial con el adaptador conectado.
- Retire el envase de plástico del adaptador sujetando el vial con una mano, presionando los lados del envase del adaptador con la otra mano y luego levantando el envase hacia arriba. Tenga cuidado de que el adaptador no se salga del vial.




- Sostenga con una mano el adaptador con el vial conectado. Coloque la punta de la jeringa en la parte del conector del adaptador del vial.
- Fije suavemente la jeringa en el vial girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que note resistencia.



#### Paso 5 - Preparación de la solución


- Mantenga el vial verticalmente en la superficie con la jeringa hacia abajo.
- Empuje lentamente el émbolo de la jeringa hacia abajo hasta que la jeringa esté vacía. No retire la jeringa del vial.
- Con la jeringa todavía conectada al adaptador del vial, gire suavemente el vial con la jeringa conectada hasta que se disuelva el polvo. Evite que se forme espuma. No agite el vial.




- **Deje que el vial con la jeringa conectada permanezca en la superficie durante 5 minutos a temperatura ambiente para permitir que la solución se disuelva por completo.** El émbolo puede levantarse por sí solo de nuevo; esto es normal.

#### Paso 6 - Extracción de la solución

- Compruebe si la solución tiene partículas. Se debe haber disuelto todo el polvo y la solución debe ser transparente.
- Presione lentamente el émbolo de la jeringa totalmente hacia abajo.
- Gire por completo hacia abajo el vial, el adaptador y la jeringa.
- Mientras lo mantiene en vertical, tire lentamente del émbolo para poner toda la solución en la jeringa. No lo agite.



#### Paso 7 – Preparación de la jeringa para la administración



- Gire por completo hacia arriba el vial, el adaptador y la jeringa (con la jeringa en la parte superior). Desconecte la jeringa llena del adaptador sujetando el adaptador con una mano y girando suavemente la jeringa en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Coloque el vial y el adaptador conectado en el contenedor para residuos suministrado.  
No toque la punta de la aguja ni permita que toque ninguna superficie. Coloque la jeringa sobre la superficie limpia y

#### Paso 8 - Inserción de la aguja

#### Paso 9 - Preparación del lugar de la inyección para la inyección subcutánea.

- Seleccione un lugar adecuado (“lugar de la inyección”) en su **abdomen** para la inyección debajo de la piel.
- **Evite el área alrededor del ombligo. Seleccione un lugar de inyección diferente del que usó el día anterior para que la piel se pueda recuperar después de la inyección.**
- Use la segunda toallita con alcohol para limpiar el lugar de la inyección que haya elegido.

#### Paso 10 - Administración

- Retire con cuidado la tapa de protección de la aguja y tírela. Asegúrese de que la aguja no toque nada antes de la inyección.
- Mantenga la jeringa al nivel de los ojos con la aguja apuntando hacia arriba.
- Elimine las burbujas de aire golpeando el lado de la jeringa con su dedo para que las burbujas suban hacia la punta. Luego, empuje lentamente el émbolo hasta que salga una pequeña cantidad de líquido de la aguja.
- Pellizque suavemente la piel limpia entre los dedos pulgar e índice para hacer un pliegue.
- Mantenga este pliegue de la piel durante toda la inyección.
- Introduzca toda la aguja en el pliegue de la piel con un ángulo como se muestra en la ilustración.
- Presione el émbolo hacia abajo todo lo que pueda.
- Tire de la aguja con el mismo ángulo como la insertó. No frote el lugar de la inyección.

#### Paso 11 - Después de la administración

- Inmediatamente después de la inyección, coloque el protector de seguridad de la aguja sobre la aguja, hasta que encaje en su lugar.
- Ponga la jeringa con la aguja en un contenedor para residuos.

#### **Precauciones/Contraindicaciones:**

- Cablivi® aumenta el riesgo de sangrado.
- Contraindicado en hipersensibilidad al principio activo.
- Contraindicado en hipersensibilidad a alguno de los excipientes:
  - Sacarosa
  - Ácido cítrico anhidro (E 330)
  - Citrato trisódico dihidratado (E 331)
  - Polisorbato 80