

PROTOCOLO DE AMINISTRACIÓN

HOSPITAL DE DÍA

Hospital SAS La Línea

Servicio de Farmacia

Área de Mezclas Intravenosas

956 969272

EPTINEZUMAB

Presentación: 100 mg / 1 ml

Vía administración: PERFUSIÓN INTRAVENOSA (VÍA PERIFÉRICA)

Precauciones especiales: Conservar en nevera (2-8°C)

Consideraciones previas:

- La dosis recomendada es de 100 mg administrados mediante perfusión cada 12 semanas. Algunos pacientes pueden beneficiarse de una dosis de 300 mg administrada mediante perfusión cada 12 semanas que será valorado por el Servicio de Neurología.

Premedicación:

- No precisa

Preparación y Ritmo de perfusión de la mezcla:

- Tanto para la dosis de 100 mg como para la de 300 mg, debe utilizarse una bolsa de **100 ml de solución inyectable de cloruro de sodio de 9 mg/ml (0,9%)** para preparar la solución para perfusión de VYEPTI según se describe a continuación.
- Invierta la solución para perfusión de EPTINEZUMAB suavemente para que se mezcle por completo. No la agite. Una vez preparada la dilución para perfusión debe perfundirse en el plazo de 8 horas.
- **Perfundir durante aproximadamente 30 minutos.**
- El profesional sanitario responsable debe observar o controlar al paciente durante y después de la perfusión, de conformidad con la práctica clínica habitual.
- **No administrar EPTINEZUMAB como inyección en bolo.**

Precauciones/Contraindicaciones:

- Contiene Sorbitol. No administrar en casos de intolerancia hereditaria a la fructosa.
- No se recomienda el uso en embarazo o durante la lactancia.
- No administrar en caso de hipersensibilidad al fármaco.