

PROTOCOLO DE AMINISTRACIÓN

HOSPITAL DE DÍA

Hospital SAS La Línea

Servicio de Farmacia

Área de Mezclas Intravenosas

956 969272

INMUNOGLOBULINA G HUMANA

Presentación: 20 g / 200 ml

10 g / 100 ml

5 g / 50 ml

Vía administración: PERFUSIÓN INTRAVENOSA (VÍA PERIFÉRICA)

Consideraciones previas:

- La dosis y duración de la terapia deben ser individualizadas de acuerdo con la situación clínica y la respuesta del paciente.
- Tomar peso corporal para la determinación de la dosis (0,4 g/Kg) y la velocidad de infusión.
- Monitorizar Tensión Arterial y frecuencia cardiaca cada 30 minutos y/o cambio de velocidad de infusión.
- Antes de iniciar la perfusión:
 - Una hidratación adecuada antes de iniciar la perfusión de IgIV.
 - Monitorizar la diuresis.
 - Monitorizar los niveles de creatinina sérica.
 - Evitar el uso concomitante de diuréticos del asa.

Premedicación:

- Paracetamol 1g IV

Ritmo de perfusión de la mezcla:

Peso corporal	0,01 ml/Kg/min	Aumentar a los 30 min a 0,02 ml/Kg/min	Aumentar a los 30 min a 0,04 ml/Kg/min	Velocidad máxima 0,08 ml/Kg/min
10	6	12	24	48
20	12	24	48	96
30	18	36	72	144
40	24	48	96	192
50	30	60	120	240
60	36	72	144	288
70	42	84	168	336
80	48	96	192	384
90	54	108	216	432
100	60	120	240	480