

PROCOLO DE AMINISTRACIÓN

HOSPITAL DE DIA

Hospital SAS La Línea

Servicio de Farmacia

Área de Mezclas Intravenosas

956 969272

RESLIZUMAB

Presentación: 25 mg / 2,5 ml

100 mg / 10 ml

Vía administración: PERFUSIÓN INTRAVENOSA (VÍA PERIFÉRICA)

Precauciones especiales: Conservar en nevera (2-8°C)

Consideraciones previas:

- La dosis recomendada se basa en el peso corporal del paciente y solo se debe ajustar si se producen cambios importantes en el peso corporal. *Pacientes de entre 35 kg y 199 kg:*

Peso Corporal (Kg)	Dosis total de Reslizumab (mg)
35-41	100
42-49	125
50-58	150
59-66	175
67-74	200
75-83	225
84-91	250
92-99	275
100-108	300
109-116	325

Premedicación:

- No precisa

Preparación y Ritmo de perfusión de la mezcla:

- Preparación en farmacia.** La solución será preparada en 50 ml de suero salino al 0,9%.
- Añadir filtro 0,22 micras al sistema de infusión.**
- Perfundir vía intravenosa durante 60 minutos.**
- El profesional sanitario responsable debe observar o controlar al paciente durante y después de la perfusión, de conformidad con la práctica clínica habitual.
- No administrar RESLIZUMAB como inyección en bolo, ni vía subcutánea ni intramuscular.**

Precauciones/Contraindicaciones:

- Contiene sacarosa.
- No se recomienda el uso en embarazo o durante la lactancia.
- No administrar en caso de hipersensibilidad al fármaco.

